

**Fund af coloradobiller i Danmark i 2011**

I sidste uge blev der fundet enkelte larver i industrikartofler ved Bylderup-Bov.

Kartoffelafgiftsfonden

- [Oversigt over registrerede fund af Coloradobiller i 2011](#)
- [Oversigt over tidligere registrerede fund](#)
- [Bekæmpelse](#)



Oversigt over registrerede fund af coloradobiller i 2011



[Til top](#)

Dato	Lokalitet	Antal	Afgrøde
11. juli	Mellem Billund og Grindsted	En del voksne biller og larver	En stak affald med spildkartofler og halm
11. juli	Skarrild	En del voksne biller, æg og larver	Spildplanter af kartofler
5. juli	Bylderup-Bov	Enkelte larver	Industrikartofler
28. juni	Billund	En enkelt voksen bille	Triticalemark efter kartofler
13. april	St. Jyndeved	Enkelte biller	Spildkartofler

Oversigt over tidligere registrerede fund

[Til top](#)

Oversigt over fund af coloradobiller i [2010](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2009](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2008](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2007](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2006](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2005](#)



Æggene lægges på bladenes underside. Den voksne bille.

Udseende

Den voksne bille er let kendelig på dækvingernes farve, de er gule med fem sorte striber på hver. Billens længde er ca. 10 mm. Larverne er pukkelryggede, røde og med to rækker sorte pletter på sidernes nederste dele. De opnår en længde på ca. 12 mm. Larverne forveksles ofte med pupper af mariehøns.

Levevis og spredning

Billerne overvintrer i jorden. Om foråret opsøger de kartoffelplanter, som de ernærer sig af. Æggene lægges på bladenes underside. Når larverne er udvoksede, går de i jorden for at forpuppe sig. Der udvikles næppe mere end én generation årligt her i landet. Kun billerne er i stand til at sprede sig over større afstande. Spredningen kan være aktiv, men den vil som regel suppleres med passiv transport med vind og vand. Det sker, at enkelte biller transporteres med planteprodukter over store afstande, f.eks. fra middelhavsområdet til Danmark.

Tidspunkt

Da arten ikke er etableret i Danmark og kun i meget begrænset omfang har overvintret her, er de fleste observationer baseret på indflyvende biller. Invasionstidspunktet og billernes antal er meget afhængigt af vejrforholdene. De største invasioner er begyndt 5.-10. juni med påfølgende æglægning og angreb af larver, men også i august kan der forekomme betydelige antal.

Værter

Kun kartoffel har betydning som vært.

Symptomer

Både biller og larver æder kartoffelplanter. Først afløves bladene, og hvis disse ikke slår til, kan stænglerne også ædes helt eller delvis. Coloradobiller optræder oftest først i gengrøninger, derefter i almindelige marker.

Bekæmpelse

[Til top](#)

Siden 15. oktober 1997 er coloradobillen ikke længere omfattet af lov om offentlig bekæmpelse. Der er således ikke længere anmeldelsespligt ved fund af coloradobiller. Undtaget er dog fortsat læggekartoffelarealer. Her må der fortsat ikke forefindes coloradobiller på arealet inden for autorisationen. Ved udbredt angreb af coloradobiller bekæmpes larverne med enten Cyperb 100 eller Karate 2,5 WG.

Latinsk navn. Leptinotarsa decemlineata.

Kilde: Markens sygdomme og skadedyr: Ghita Cordsen Nielsen og Jørgen P. Jensen