

Hjem > Kartoffelafgiftsfonden > 2011 > Registreringsnet > **Varsling for kartoffelskimmel**

Varsling for kartoffelskimmel


Efter omlægning af PlanteInfo til LandbrugsInfo vises registreringsnettet og infektionstrykket af kartoffelskimmel nu Kartoffelafgiftsfonden kun på LandbrugsInfo.

I sidste uge var der en ustadig nedbørsperiode, som gav 2-3 dage med skimmelvej i Sønderjylland og på Lolland. Dette giver anledning til at beskytte de tidligste spisekartofler før næste skimmelfavorable periode på grund af den markant lavere resistens og den store betydning af kvalitet. Erfaringer fra tidligere år viser, at der oftest skal to perioder med skimmelfavorabelt vejr til, før der er opbygget smitstof.

På grund af revurdering af mange af skimmelmidlerne er der forskel på brugsanvisningen på gamle og nye etiketter. Husk at det er etikettens brugsanvisning, som er gældende. I følge den nye brugsanvisning for eksempelvis Dithane NT må der ikke behandles med Dithane NT før st. 32 (20 pct. af planterne mødes i rækkerne). Hvis der behandles før st. 32 anbefales at behandle med 0,1 l/ha Ranman eller 0,3 l/ha Revus, så længe der ikke er fundet skimmel i Danmark. Husk sprøjtefrist på henholdsvis 7 og 3 dage for Ranman og Revus.

Registreringsnettet for kartoffelskimmel

Efter omlægning af PlanteInfo til LandbrugsInfo vises registreringsnettet og infektionstrykket af kartoffelskimmel nu kun på [LandbrugsInfo](#).



Figur 1. Registreringsnettet for kartoffelskimmel.


Registreringsnettet for kartoffelskimmel bygger på indberetninger fra konsulenter, som har deres gang i kartoffelmarker. Der er endnu ikke fundet skimmel af betydning i Danmark. Der er gjort et enkelt fund under plast på Samsø, men dette fund har ingen betydning for udbredelse af skimmel i Danmark. Lignende registreringsnet for kartoffelskimmel i Holland, England, Norge, Sverige og Finland viser ligeledes endnu ingen forekomst af skimmel.



Infektionstryk for kartoffelskimmel

Risikotallene for skimmel vises kun til dags dato og endnu ikke som prognose for de kommende dage. Vi forventer, at prognosen er klar inden for 14 dage. Som noget nyt kan man nu få vist risikotallene for det postdistrikt, hvor marken ligger.

Brug vejrudsigten, så godt som muligt, indtil prognosen foreligger. Det er skimmelfavorabelt, når der er >10 timer med 10 °C og en luftfugtighed >88 pct. i mere end to dage. Dette er ofte gældende ved kraftige eller længerevarende nedbørsperioder kombineret med høje nattemperaturer på over 10 °C.

Hvor der dyrkes kartofler i et tæt sædskifte mindre end 3-4 år, er der en lille risiko for, at der kan optræde planter inficeret via jordsmitte. Trods sidste uges nedbør er jorden generel meget tør. Hold alligevel øje med lavninger og områder, hvor jorden kan have været vandmættet.





Figur 2-5. Infektionstrykket for skimmel ved fire lokaliteter. Infektionstrykket vises kun til dags dato. Prognosen forventes klar inden for 14 dage. Når infektionstrykket er over 40, er der høj risiko for skimmel. Når infektionstrykket er mellem 20 og 40, er der middels risiko og når det er under 20, er der lav risiko. Se [LandbrugsInfo](#).

By Rich Haddock