

## Risiko for kartoffelskimmel

Der er nu risiko for begyndende angreb af kartoffelskimmel i de tidligste lagte kartofler. Af hensyn til forsigtighedsprincippet bør alle kartofler derfor behandles snarest.


Kartoffelafgiftsfonden

Vi står nu overfor udsigten til en tredje skimmelfavorabel periode på flere lokaliteter i Danmark. Dette gælder specielt spise-, chips-, pulver- og læggekartofler, men også modtagelige melsorter, hvor kartoffelskimmel kan få store konsekvenser. Der kan være lokale forhold som eksempelvis Nordjylland, hvor skimmelrisikoen har været lav, og hvor risikoen for skimmelangreb fortsat er lille i de mest skimmelresistente melsorter som eksempelvis Kuras.

Risikoen for kartoffelskimmel har generelt været lav i foråret 2011. I dele af syd- og vestdanmark, Samsø, Sjælland og Lolland/Falster, har der været to perioder med risikoværdier tæt på 40, som er tommelfingerreglen for, risiko for kartoffelskimmel. [Se risikotallene for kartoffelskimmel på Landbruksinfo](#). Der er udsigt til en tredje skimmelfavorabel periode og rækkelukning på flere lokaliteter i Danmark.

Da der endnu ikke findes smitstof i Danmark, kan der anvendes:

- 2 kg/ha Tridex eller 2 kg/ha. Dithane NT (efter 20 pct. rækkelukning)
- 0,1 l/ha Ranman
- 0,3 l/ha Revus



Figur 1. Infektionstrykket i Dronninglund (Nordjylland) viser en generel lav risiko for skimmel.



Figur 2. Infektionstrykket i Billund (Midtjylland) viser fortsat to perioder med middel risiko.



Figur 3. Infektionstryk ved Slagelse (Sjælland) viser to perioder med høj risiko for skimmel.

By Rich Haddock