

Hjem > Kartoffelafgiftsfonden > 2012 > Registreringsnet > **Første fund af kartoffelskimmel**

Første fund af kartoffelskimmel

Kartoffelskimmel er nu fundet i både økologisk og konventionelt dyrkede spisekartofler. Fundenes placering er afbildet på registreringsnettet for kartoffelskimmel på Landbrugsinfo. Kartoffelafgiftsfonden

Der er nu gjort to fund af kartoffelskimmel i Danmark. Se [registreringsnettet for kartoffelskimmel](#) på Landbrugsinfo. Fundene er gjort i to marker med spisekartofler, hvoraf den ene er henholdsvis konventionel og økologisk dyrket. Dette var ventet efter en lang periode med skimmelfavorabelt vejr (se [infektionstrykket](#) ved Vojens, hvor et af fundene er gjort). Angrebne konventionelt dyrkede marker behandles med 2 kg Ridomil Gold (først efter rækkelukning). Før rækkelukning anvendes 2,2 kg Curzate efterfulgt af et effektivt middel i fuld dosering af Ranman eller Revus.

Der er nu risiko for sekundær spredning af skimmelsporer. Alle marker forventes nu at være behandlet, og der skal forsættes med en effektiv behandling med hensyntagen til skimmelrisikoen.

Forsøgene igennem flere sæsoner viser, at der med fordel kan bruges reducerede doseringer af Ranman og Revus i lavrisikoperioder, og hvor der ikke er skimmel i området. I højrisikoperioder, i meget modtagelige sorter og hvor der er skimmel i området, anvendes fortsat fuld dosering. Hvor vejruddisigten er usikker bruges en højere dosering. Det betyder derfor, at man selv skal se efter skimmel i marken og nabomarken samt følge med i registreringsnettet og i vejruddisigten for brug af variable doseringer.



Figur 1. [Registreringsnettet for kartoffelskimmel](#) på Landbrugsinfo.



Figur 2. Infektionstryk ved Vojens den 29. juni.

By Rich Haddock