




Fund af coloradobiller i Danmark 2012

Den 10. juli er der ved Tinglev fundet mange coloradobillelarver i en mark med industrikartofler.

Kartoffelafgiftsfonden

- [Oversigt over registrerede fund af coloradobiller i 2012](#)
- [Oversigt over tidligere registrerede fund](#)
- [Udseende](#)
- [Levevis og spredning](#)
- [Tidspunkt](#)
- [Værter](#)
- [Symptomer](#)
- [Bekæmpelse](#)




Oversigt over registrerede fund af coloradobiller i 2012

Dato	Lokalitet	Antal	Afgrøde
10. juli	Tinglev	Mange larver	Mark med industrikartofler
28. juni	Billund	1 voksen bille	Mark med kartofler
23. juni	Bylderup Bov	1 voksen bille	Mark med stivelseskartofler


[Til top](#)

Oversigt over tidligere registrerede fund

Oversigt over fund af coloradobiller i [2011](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2010](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2009](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2008](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2007](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2006](#)
 Oversigt over fund af coloradobiller i [2005](#)



Æggene lægges på bladenes underside.



Den voksne bille.

[Til top](#)

Udseende

Den voksne bille er let kendelig på dækvingernes farve, de er gule med fem sorte striber på hver. Billens længde er ca. 10 mm. Larverne er pukkelryggede, røde og med to rækker sorte pletter på sidernes nederste dele. De opnår en længde på ca. 12 mm. Larverne forveksles ofte med pupper af mariehøns.

[Til top](#)

Levevis og spredning

Billerne overvintrer i jorden. Om foråret opsøger de kartoffelplanter, som de ernærer sig af. Æggene lægges på bladenes underside. Når larverne er udvoksede, går de i jorden for at forpuppe sig. Der udvikles næppe mere end én generation årligt her i landet. Kun billerne er i stand til at sprede sig over større afstande. Spredningen kan være aktiv, men den vil som regel suppleres med passiv transport med vind og vand. Det sker, at enkelte biller transporteres med planteprodukter over store afstande, f.eks. fra middelhavsområdet til Danmark.

[Til top](#)

Tidspunkt

Da arten ikke er etableret i Danmark og kun i meget begrænset omfang har overvintret her, er de fleste observationer baseret på indflyvende biller. Invasionstidspunktet og billernes antal er meget afhængigt af vejrforholdene. De største invasioner er begyndt 5.-10. juni med påfølgende æglægning og angreb af larver, men også i august kan der forekomme betydelige antal.

[Til top](#)

Værter

Kun kartoffel har betydning som vært.

[Til top](#)

Symptomer

Både biller og larver æder kartoffelplanter. Først afløves bladene, og hvis disse ikke slår til, kan stænglerne også ædes helt eller delvis. Coloradobiller optræder oftest først i gengrøninger, derefter i almindelige marker.

[Til top](#)

Bekæmpelse

Siden 15. oktober 1997 er coloradobillen ikke længere omfattet af lov om offentlig bekæmpelse. Der er således ikke længere anmeldelsespligt ved fund af coloradobiller. Undtaget er dog fortsat læggekartoffelarealer. Her må der fortsat ikke forefindes coloradobiller på arealet inden for autorisationen. Ved udbredt angreb af coloradobiller bekæmpes larverne med enten Cyperb 100 eller Karate 2,5 WG.

Latinsk navn. Leptinotarsa decemlineata.

Kilde: Markens sygdomme og skadedyr: Ghita Cordsen Nielsen og Jørgen P. Jensen

[Til top](#)