

# Ukrudtsstrategier og bekæmpelse af spildplanter

Poul Henning Petersen

**SEGES**

STØTTET AF

**Kartoffel**afgiftsfonden




# Tanker bag afprøvning af strategier for ukrudtsbekæmpelse


- Strategier med Proman, Fenix, Centium og Novitron
- Kan 2 gange lave doser af Fenix erstatte 2 x Titus, som er forbudt og kører på årlig dispensation? Måling af restkoncentration.
- Glyphosat først og derefter jord-/bladmidler så tæt på fremspiring som muligt – giver det højere effekt?
- Clomazon i forskellige kombinationer – hvad kan midlet/aktivstoffet?

Middel	Aktivstof	Virkemekanisme
Fenix	Aclonifen	F3
Proman	Metobromuron	C2
Centium/Kalif	Clomazon	F4
Novitron	Aclonifen + clomazon	F3 + F4
Roundup	Glyphosat	G
Titus	Rimsulfuron	B



## Titus/Fenix split efter fremspiring





## Procent effekt





# Glyphosat for sig og jordmiddel tæt på fremspiring



# Clomazon indgår i løsning



# Fenix contra Proman



**Led 8**  
**0,25 l Centium 36 CS +**  
**2 l Roundup Bio**  
**2 l Proman**



**Led 9**  
**2 l Roundup Bio**  
**0,25 l Centium 36 CS +**  
**1,5 l Fenix**



Ubehandlet



# Pigæble



Fotos: Claus Nielsen, AKV

# Natskyggefamilien

## Kantbæger, pigæble og sort natskygge



Tidspunkt	Behandling
Omkring fremspiring	2 l Fenix
	2 l Proman
	0,25 l Command CS
	2 l Fenix + 0,25 l Command CS
	2 l Proman + 0,25 l Command CS
2 uger senere	Lentagran WP
	2 l Boxer

**Lentagran®**  
**45 WP**

Ukrudtsmiddel.

Etikette nr: //  
GODKENDT  
2. marts 2018  
for pakninger på  
Miljøstyrelsen 1kg


Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hovedkål, rosenkål, broccoli, blomkål, glaskål (kålrabi), majroer, kålroer og andre foderkål, grønkål og andre bladkål, porre, kepaløg, skalotteløg, forårsløg, hvidløg og etablerede asparges.

**SEGES**

Ubehandlet pr. 7/6



21 Proman



2 l Fenix



2 l Fenix + 0,25 l Centium



## Kantbæger, pigæble og sort natskygge, 1 forsøg 2019

Tidspunkt	Behandling	Sort natskygge 7 juni	Kantbæger/ Pigæble* 5 juli
Omkring fremspiring	2 l Fenix	55	72
	2 l Proman	0	2
	0,25 l Command CS	0	0
	2 l Fenix + 0,25 l Command CS	0	0
	2 l Proman + 0,25 l Command CS	0	0
2 uger senere	Lentagran WP		0,8
	2 l Boxer		50

Antal pr. m<sup>2</sup>

\* Kantbæger og pigæble – kunne ikke adskilles ved optælling – der var samme andel af hver art

Tabel 1. Effekt af ukrudtsmidler i kartofler. Dosis er angivet pr. ha.

Midler	Centium 36 CS <sup>1)</sup>	Fenix	Boxer	Titus <sup>2)</sup>	Novitron	Proman	Fenix <sup>2,3)</sup> + Titus	Fenix + glyphosat <sup>4)</sup>	Fenix + glyphosat <sup>4)</sup>	Novitron + glyphosat <sup>4)</sup>	Fenix + glyphosat <sup>4)</sup>	Fenix + Boxer
							Titus <sup>2)</sup>	Titus <sup>2)</sup>	Titus <sup>2)</sup>	Titus <sup>2)</sup>	Boxer	Titus <sup>2)</sup>
1 behandling	0,25 l	2,0 l	4,0 l	30 g	1,8 kg	2 l	1,5 l + 15 g	1,5 l + 1,5 l	1,0 l + 1,5 l	1,8 kg + 1,5 l	1,5 l + 1,5 l	0,75 l + 2 l
2 behandling							15 g	15 g	15 g	15 g	2 l	15 g
3 behandling									15 g			
<i>Tokimbladet ukrudt</i>												
Burresnerre	8	8	8	8	9	5	9	9	9	9	9	9
Forglemmigej	7	9	8	9		-	9	9	9	9	9	9
Fuglegræs	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Gulurt				8		-	7	8			8	6
Gåsefod, hv. m.	7	9	5	6*	8	9	9	9	9	9	9	8
Bynke, grå <sup>5)</sup>				8		-	9	9	9	9	8	9
Hanekro	6	8	8	8	7	8	9	9	9	9	8	7
Haremad	8	8	<	7	8	-	9	9	8	9	9	7
Hejrenæb						-						
Hundepersille	8			6		6				9		
Hyrdetaske	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Jordrøg		8	<	<	8	7	7	8	7	8	8	<
Kamille, lugtløs	5	7	5	9	7	8	9	9	9	9	8	8
Kamille, skive	5	7	5	9	7	8	9	9	9	9	8	8
Kantbæger	9	<	<	-	9	9	-	-	-	-	-	-

# Effekt mod spildkartofler, 4 landsforsøg 2018-19

St. 31-32

0,3 | Starane 333 HL

1 | Zypar

0,35 | Pixxaro EC

0,75 | Mustang forte

0,3 | Starane 333 HL  
+ 1 | Zypar

0,3 | Starane 333 HL  
+ 0,75 | Mustand forte

St. 39-45

Før høst

0,75 | Mustang forte  
0,35 | Pixxaro EC  
2,7 | Roundup Bio

0,35 | Pixxaro EC  
2,7 | Roundup Bio






Foto: Poul Henning Petersen, SEGES



Starane, Pexxaro, Mustang forte, Zypar st. 31-32

Glyphosat før høst

## Bekæmpelse af spildkartofler - effekt på knoldsætning i 2018 og 2019, 2 x 2 forsøg

St. 31-32

0,3 | Starane 333 HL

1 | Zypar

0,35 | Pixxaro EC

0,75 | Mustang forte

0,3 | Starane 333 HL  
+ 1 | Zypar

0,3 | Starane 333 HL  
+ 0,75 | Mustand forte

0,75 | Mustang forte

St. 39-45

0,35 | Pixxaro EC

2,7 | Roundup Bio

Før høst

0,35 | Pixxaro EC

2,7 | Roundup Bio

2,7 | Roundup Bio

