

Planter

Undgå rester af flonicamid i fraserterede læggekartofler til konsum

Ved anvendelse af Teppeki mod lus i læggekartofler, hvor frasertering af over/understørrelse anvendes til konsum, skal man være opmærksom på, at der kan forekomme rester af aktivstoffet i flonicamid.

Nyhed | 01. juli 2020

Der er aldrig fundet rester af flonicamid i danske konsumkartofler, men på det centraleuropæiske marked er der eksempler på kartoffelindkøbere, der ikke vil modtage kartofler, der er behandlet med Teppeki, på grund af risiko for rester.

Begrundelsen for dette er, at selv om grænseværdien for flonicamid er overholdt, vil visse supermarkeds kæder kun acceptere restkoncentrationer på 30-50% af grænseværdien.

Der har kun været enkelte tilfælde, hvor grænseværdien på 0,09 ppm pr. kg er overskredet, mens der i flere tilfælde har været usikkerhed om partierne kunne overholde de kundespecifikke kravværdier på 30-50 % af den officielle grænseværdi.

Praktiske oplysninger i brugen af Teppeki:

Der er større risiko for rester, hvor Teppeki bruges i kombination med virusolie (Fibro)

Brug Teppeki tidligt i sæsonen inden (fuld) blomstring. Det nedsætter risikoen for rester i knoldene

Hav styr på hvilke krav fraserteringen skal overholde hos din aftager

Kilde: [Nordisk Alkali](#)

Emneord

[Bekæmpelsesmidler](#)[Kartofler](#)[Pesticidhåndtering](#)

Sidst bekræftet/revideret: 01. juli 2020

Vil du vide mere?



**Lars Bødker**

Landskonsulent, Kartoffler

SEGES

lab@seges.dk

+45 8740 5452

SEGES	Tlf.	87 40 50 00
Agro Food Park 15	Fax.	87 40 50 10
8200 Aarhus N	Email	info@seges.dk