



Hjem > Kvægafgiftsfonden > 2011 > Sundhed - Klovsundhed > **Derfor bør kloveskæring ske før kælvning**

Derfor bør kloveskæring ske før kælvning

Mange får deres dyr efterset af kloveskæreren efter kælvning, men da er skaden allerede sket.


Kvægafgiftsfonden

Mælkeafgiftsfonden

I tiden op til kælvning sker der store hormonelle forandringer, som påvirker koen på mange måder.

Blandt andet frigives der de sidste to-fire uger før kælvning hormoner, som sørger for opblødningen (lødningen) af fødselsvejen, så kalven kan komme ud. Disse hormoner påvirker dog ikke kun bækkenregionen men også klovenets ophæng.

I praksis betyder hormonpåvirkningen, at klovenet omkring kælvning vil synke længere ned mod læderhuden end ellers, og knoglens tryk på læderhuden resulterer i smertefulde blødninger omkring læderhuden (laminitis). Disse blødninger vil to-tre måneder senere ved kloveskæring kunne ses som såleblødninger.



Når tyngdepunktet flyttes frem, mindses klovenets pres, og risikoen for laminitis og såleblødninger bliver mindre.

Kloveskæring flytter tyngdepunktet

Vi kan ikke fjerne kælvningshormonernes indvirkning på klovenets ophæng. Derfor er det ekstra vigtigt at begrænse andre uheldige faktorer i tiden omkring kælvning. Dette gøres blandt andet med en kloveskæring omkring goldning, som flytter klovens tyngdepunkt fremad.

Tyngdepunktet er det sted, hvor det meste af koens vægt trykker gennem kloven og ned i gulvet, og tyngdepunktets placering er afhængigt af klovens form. En ubeskåret og spids klov, vil have et tyngdepunkt, som ligger længere tilbage (rød pil) end en nybeskåret klov med en tåvinkel på 45 - 50 grader.

Når klovens form går fra spids til korrekt form, flyttes tyngdepunktet fremad og her (grøn pil) buer klovenet en smule opad. Det betyder, at klovenet får mindre tendens til at presse mod læderhuden, og dermed bliver risikoen for blødninger mindre, når kloven har den korrekte form. Derfor bør kloveskæring altid ske før kælvning.

Laminitis og de senere såleblødninger skyldes sædvanligvis, at flere uheldige faktorer påvirker kloven samtidig blandt andet ståt, foderskift, klovform, kælvningshormoner og mange flere.

Såleblødninger gør klovhornet porøst og skaber grundlag for udvikling af sålesår, dobbeltsål og hul væg.