

”Best practice” for effektiv smittebeskyttelse mod *Mycoplasma bovis* i slagtekalvebesætninger

Benyt faste leverandører

Etablér gode relationer til leverandører, der sikrer løbende tilbagemelding om ændring af sundhedstilstanden i besætningen

Tjek sundhedsstatus og dødelighed for leverandør umiddelbart før indsættelse

Undlad indsættelse af kalve fra leverandører med kliniske tegn på mycoplasma-infektion i besætningen

Tjek alle kalve ved indsættelse (anvend standardiseret model til luftvejsscreening:

<https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Koedproduktion/Slagtekalve/Sider/Screening-for-lungebetaendelse-hos-kalve.pdf?download=true>)

Kalve med tegn på behandlingskrævende sygdom eller feber samt kalve med tegn på kroniske luftvejsinfektioner (fx unormal øreholdning) afvises

Foretag screening for luftvejsinfektioner af alle kalve i indsætterafsnit mindst to gange ugentlig

Kalve med behandlingskrævende infektioner behandles umiddelbart

Ved større sygdomsudbrud eller mangelfuld behandlingseffekt foretages diagnostiske undersøgelser

Ved afsluttet behandlingsforløb vurderes kalven med henblik på ”raskmelding” eller genbehandling

Kalve med luftvejsinfektioner søges i videst muligt omfang isoleret

Kalve med tegn på kronisk infektion skal aflives eller holdes isoleret fra de raske kalve

Benyt handsker under fodring – rengør og desinficer disse mellem håndtering af kalve i forskellige hold

Håndtér de yngste kalve først

Håndtér eventuelle syge kalve til sidst

Derudover bør tænkes på optimering af opstaldning (min. 3 m² pr. kalv), sektionering, holdstørrelse, ventilation og fodring (mindst 2 x 3 liter mælk dgl.) og hygiejne (vandkar, foderskole m.v.) samt minimering af flytning, foderskift m.v.
