


## Værd at vide om kvægsygdommen Parafilaria bovicola

**Parafilaria bovicola** sygdom, der rammer kvæg. Smitten overføres med kvægfluen. Læs mere her om symptomer, udbredelse, behandling m.m.

[Symptomer](#)  
[Udbredelse](#)  
[Risiko for mennesker](#)  
[Smittet besætning](#)  
[Behandling](#)  
[Erstatning](#)  
[Kontakt](#)

[Detaljeret beskrivelse](#)



Parafilaria bovicola hører til blandt de smitsomme sygdomme hos kvæg.

### Symptomer

Parafilaria bovicola skyldes smitte med en lille rundorm.

Symptomerne er små, blødende sår, der siver længe, før blodet størkner. Disse blødninger ses især på den forreste del af ryggen.

### Udbredelse

Sygdommen bringes rundt mellem kreaturer med kvægfluen. Fluerne suger næring til sig i de små, blødende sår, hvor hun-ormen har lagt sine æg. Æggene modnes i kvægfluen i løbet af 10-12 dage og kan så føres videre til andre kreaturer gennem sår eller tåreflåd.

### Risiko for mennesker?

Parafilaria bovicola smitter ikke til mennesker, men udelukkende til andre kreaturer.

Der er altså ingen risiko for landmanden eller dennes familie ved at færdes i stalden.

### Besætningen er smittet - hvad sker der?

Da Parafilaria bovicola ikke overføres til mennesker, men udelukkende kan overføres til kreaturer med kvægfluen, vil besætningen blive lukket, indtil dyrene er blevet behandlet med ormemiddel, og fluerne er bekæmpet.

De slagtedy, der har udbredte skader i hud, underhud og muskulatur bliver kasseret - for landmandens egen regning.

### Behandling

Da overførslen sker via en kvægflue, skal dyrene tages på stald og behandles med fluemiddel. Hårdt angrebne dyr behandles med ormemiddel.

**Erstatning**

Der gives ikke kompensation for kasserede slagtekroppe.

**Kontakt**

Har du spørgsmål vedrørende Parafilaria bovicula hos kvæg, er du velkommen til at kontakte [SEGES' veterinære beredskab for Kvæg](#).