


API MILDE LØBESÅR HOS KØERNE PÅVIRKER IKKE PRODUKTIONEN

STØTTET AF

Kvægafgiftsfonden

Mange danske malkekøer har milde former af løbesår. Ny undersøgelse fastslår, at det ikke har effekt på produktionen.

Mellem 80 og 90 pct. af de danske malkekøer går rundt med milde former af løbesår. Det viste en undersøgelse i 2016. Omfanget overraskede forskerne ved både Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som derfor satte sig for at finde ud af, hvorvidt de milde løbesår påvirker køerne. Resultatet af deres undersøgelse foreligger nu.



"Vi undersøgte 1.300 Holsteinkøer efter slagtning fra 190 besætninger og registrerede deres forekomst af den milde type af løbesår," forklarer professor Søren Saxmose Nielsen, Københavns Universitet.

"Herefter så vi på, om der var en sammenhæng mellem løbesårene og deres produktionsdata – hhv. mælkeydelse, slagtevægt og tomdage."

Forskerne fandt ingen sammenhæng og konkluderer derfor, at de milde typer af løbesår ikke synes at have en målbar effekt på disse parametre.

Hvorvidt de milde løbesår påvirker dyrenes velfærd, ved man ikke. Det er muligt, at milde tilfælde af løbesår kan være forbundet med mavesmerter. Det er dog uklart hvor stor en andel af køerne, der i så fald oplever smerte, ligesom graden af eventuel smerte ved milde løbesår er

ukendt.

Læs mere om undersøgelsen i artikelen 'Ingen målbare produktionseffekter af milde løbesår hos malkekvæg' på www.landbrugsinfo.dk/merekvaegnyt

FAKTA OM LØBESÅR

Løbesår opstår i løbens indvendige væg og findes i varierende grader. Hvorfor de opstår, ved man ikke præcist. Stress spiller muligvis en rolle, da det mindsker det beskyttende slimlag på indersiden af løbevæggen. Svære løbesår kan påvirke køerne meget kraftigt, og de kan dø inden for relativt kort tid. I de mindre alvorlige tilfælde varierer skaderne fra små overfladiske sår i løbeslimhinden til dybere sår med blødning.

Artiklen har været bragt i **KvægNYT nr. 3, 2019**