

PVO vintersæd efterår

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Ukrudtsmodulet i beslutningsstøtte-systemet [Planteværn Online](#) (PVO) beregner ud fra oplysninger om ukrudtsart og størrelse en tilstrækkelig dosis.

Doseringsvejledningerne bygger primært på forsøg ved DJF, Århus Universitet og i mindre omfang på resultater fra Landsforsøgene og fra forsøg i øvrigt udført af kemikaliefirmaer m.fl.

Det fulde udbytte af PVO i form af de mest præcise løsningsforslag fås, hvis du kender ukrudtsarterne på marken, deres tæthed og deres størrelse, og indrapporterer disse oplysninger i værktøjet "Ukrudt - Problemløsning". Nedenfor er vist tabeller over doseringsforslag fra PVO for de hyppigst anvendte herbicider overfor vigtige ukrudtsarter. Dette viser ukrudtsmidlernes stærke og svage sider.

Tokimbladet ukrudt

Tabel 1 og 2 viser doseringsforslag for udvalgte midler med en række tokimbladede ukrudtsarter. Bemærk, at ikke alle midler er godkendt i alle vintersædsafgrøder.

Tabel 1 – 4 kan udskrives enkeltvis eller [samlet](#) i pdf-format.

[Tabel 1.](#) Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om efteråret, ukrudt med 1-2 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m². Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha.

Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede uden udlæg, udbyttensniveau 50-75 hkg/ha, vækststadie 11, JB4, temp (min.-max.) 8-14 grader C.

[Tabel 2.](#) Tokimbladet ukrudt i vinterhvede om efteråret, ukrudt med 1-2 løvblade, 41-150 ukrudtsplanter pr. m². Nødvendig dosis i gram eller liter pr. ha.

Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede uden udlæg, udbyttensniveau 50-75 hkg/ha, vækststadie 11, JB4, temp (min.-max.) 8-14 grader C.

Græsukrudt

Tabel 3 og 4 viser doseringsforslag for udvalgte midler med en række græsukrudtsarter. Bemærk, at ikke alle midler er godkendt i alle vintersædsafgrøder.

[Tabel 3.](#) Græsukrudt i vinterhvede om efteråret, ukrudt med 1-2 løvblade, 11-40 ukrudtsplanter pr. m². Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede uden udlæg, udbyttensniveau 50-75 hkg/ha, vækststadie 11, JB4, temp (min.-max.) 8-14 grader C.

[Tabel 4.](#) Græsukrudt i vinterhvede om efteråret, ukrudt med 1-2 løvblade, 41-150 ukrudtsplanter pr. m². Nødvendig dosis i g, liter eller tab. pr. ha. Kilde: Planteværn Online. Forudsætninger: Vinterhvede uden udlæg, udbyttensniveau 50-75 hkg/ha, vækststadie 11, JB4, temp (min.-max.) 8-14 grader C.

Forårs-bekæmpelse

I dyrkningsvejledningen ["Ukrudt i vintersæd om foråret – Planteværn Online"](#) findes en oversigt over løsningsforslag til forårsbekæmpelse af ukrudt.

Kommentarer

Planteværn Online er afprøvet i et meget stort antal forsøg, hvor programmets bekæmpelsesforslag har bekæmpet den tilstedeværende ukrudtsbestand fuldt tilfredsstillende.

Doseringsforslagene i tabel 1, 2, 3 og 4 mod de enkelte arter er baseret på opgørelse af effekt i forsøgene. Hvor datagrundlaget for visse arter har været spinkelt, er der givet et relativt forsigtigt skøn over doseringskurven.

Selv om alle de angivne doseringer således ikke er testet, vil der være en stor sikkerhed for, at der vil blive opnået en tilstrækkelig effekt, såfremt de angivne forudsætninger er opfyldt. Det er specielt vigtigt, at betingelserne vedrørende ukrudtets størrelse er opfyldt.