

Bekæmpelse af rodukrudt

Bekæmp rodukrudt, når hovedparten af de nye skud er fremme og i god vækst.

Det bedste effekt mod tidsler, padderokker og andet rodukrudt får du ved at sprøjte når de nye skud af rodukrudt er godt fremme, så der ikke er mange små nye skud på vej. Sprøjt hellere lidt for sent end for tidligt. Tidsler er følsomme, når de har fået 4-7 blade, dvs. når tidslerne er 15-25 cm. Vær opmærksom på at få behandlet med MCPA i kornets stadium 32-39, dvs. indtil fanebladet er fuldt udviklet. En god temperatur vil sikre optimale virkningsforhold for MCPA. Der bør være omkring 14 dages afstand mellem ukrudtssprøjtning med 'minimiddel' og MCPA, så tidslerne er i god vækst.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

[Mustang forte](#) har god effekt mod kurvblomstret rodukrudt som agertidsel, gråbynke og agersvinemælk. Mod spildkartofler er midlet mere effektivt end tidligere kendte midler, og der kan forventes effektiv bekæmpelse ved anvendelse af 0,6-0,75 liter pr. ha. Mustang forte angives at have god effekt mod agerpadderokke. Midlet må ikke anvendes efter stadium 32. Vær opmærksom på restriktionerne for følgende afgrøde og anvendelse af halm.

Ved bekæmpelse i korn er det nødvendigt med en sprøjteteknik, der kan sende sprøjtevæsken ned i afgrøden. Dette gøres med grov forstøvning og lav kørehastighed. Anvend mindst 200 l vand pr. ha. Sprøjtning med luftsprøjter og luftassisterede sprøjter formodes at give en god afsætning på rodukrudt ved lavere vandmængde.

Løsningsforslag i forskellige afgrøder:

- [korn](#)
- [majs](#)
- [roer](#)

Læs også '[Bekæmpelse af kvik og rodukrudt](#)'

By Rich Haddock