

Hjem > Landdistriktsmidler > 2011 > Optimering af planteproduktionen > **Golde småaks i vinterbyg**

Golde småaks i vinterbyg

Nattefrost og store temperaturforskelle mellem nat og dag kan fremkalde symptomerne med golde småaks.

I flere vinterbygmarker ses nu mere eller mindre udbredt golde småaks, som især er tydelige i modlys.

Sen nattefrost, når aksanlæggene dannes i april, angives ifølge tyske kilder at kunne give de symptomer, som på tysk også kaldes "Laternen-krankheit".

Store temperaturforskelle mellem dag og nat f.eks. fra 25 °C til 10 °C, når fanebladet er udviklet, angives også at kunne fremkalde symptomerne.

Det er svært at angive sortsforskelle, da kulde på et givet vækststadium er afgørende for symptomernes omfang.

Erfaringsvis bliver nogle af småaksene senere bestøvet, og symptomernes betydning bliver tit overvurderet. Sæt evt. en pind ved nogle af aksene og iagttag løbende kernesætningen.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Billede 1. Bygaks med gennemskinnelige småaks. Foto: Claus Nørgaard, DL Syd.

Kontakt dit [lokale landbrugscenter](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

[Til top](#)