

Hjem > Landdistriktsmidler > 2011 > Optimering af planteproduktionen > Tjek hvedemarker på lerjord for angreb af sadelgalmyg

Tjek hvedemarker på lerjord for angreb af sadelgalmyg

Da marker med udbredte angreb kan angribes igen til næste år, er det vigtigt i år at finde marker med evt. angreb. Angreb ses især på lerjord med hyppig hvededyrkning.

Som tidligere omtalt er der i år i nogle hvedemarker fundet angreb af sadelgalmyg. Se symptomer mv. i [plantenyt nr. 406](#).

Siden er der modtaget meldinger om mere eller mindre kraftige angreb i flere hvedemarker i Sønderjylland samt om svage angreb i en mark ved Odder. Angrebene er især set på lerjord med hyppig hvededyrkning. Da angrebene er meget lokale og knyttet til bestemte marker, er det vigtigt i år at være opmærksom på marker med evt. kraftige angreb, da der kan være risiko for angreb på arealet igen til næste år. Foruden vinterhvede kan vårhvede og vårbyg angribes. Vinterbyg angribes sjældent, mens rug og havre næsten aldrig angribes.

De karakteristiske deformiteter eller "sadler" på stråene er synlige lige indtil høst, mens de fleste larver nu er søgt ned i jorden. Når man på nuværende tidspunkt kigger efter angreb, er fortykkede stængler et godt kendetegn for stængler, som skal undersøges nærmere. Fjernes bladskeuderne, ses sadlerne tydeligt, hvis stråene er angrebne.

Meldinger om evt. angreb modtages fortsat gerne.



Billede 1. Mange sadelgalmyglarver.



Billede 2. Angrebne strå med mange "sadler".

By Rich Haddock

 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug