

Tjek hvedemarker på lerjord for angreb af sadelgalmyg

Da marker med udbredte angreb kan angribes igen til næste år, er det vigtigt i år at finde marker med eventuelt angreb. Angreb ses især på lerjord med hyppig hvededyrkning.

 Hos Videncentret for Landbrug, Planteproduktion, er der i begyndelsen af juli fundet kraftige angreb af sadelgalmyg i to vinterhvedemarker på svær lerjord ved Kolding og Tåsinge.

Siden er der modtaget meldinger om mere eller mindre kraftige angreb i flere hvedemarker i Sønderjylland samt om svage angreb i en mark ved Odder.

Det fremgår at PlanteNyt på DLBR Landbrugsinfo.

- Angrebene er især set på lerjord med hyppig hvededyrkning. Da angrebene er meget lokale og knyttet til bestemte marker, er det vigtigt



Hvor hveden har været angrebet af sadelgalmyg ses de karakteristiske »sadler« på stråene lige indtil høst. (Foto: Videncentret for Landbrug)

i år at være opmærksom på marker med eventuelt kraftige angreb, da der kan være risiko for angreb på arealet igen til næste år, forklarer landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Synlig indtil høst

Foruden vinterhvede kan vårhvede og vårbyg angribes.

Vinterbyg angribes sjældent, mens rug og havre næsten aldrig angribes.

De karakteristiske deformiteter eller »sadler« på stråene er synlige lige indtil høst, mens de fleste larver nu er søgt ned i jorden.

- Når man på nuværende tidspunkt kigger efter angreb,

er fortykkede stængler et godt kendetegn for stængler, som skal undersøges nærmere. Fjernes bladskederne, ses sadlerne tydeligt, hvis stråene er angrebne, oplyser hun.

Ghita Cordsen Nielsen modtager fortsat gerne meldinger om eventuelle angreb.

kl5