

Nu er der bladlus i vintersæden

Tidlig såning og fund af mange bladlus giver behov for bekæmpelse.

AF JØRGEN P. JENSEN

Det er frykten for smittebæring af havrerødsot, som gør det aktuelt at holde bladlusmængden nede her i efteråret. Det er imidlertid ikke muligt at vide, hvor

mange bladlus der bærer havrerødsot, og derfor kan der ikke angives en bekæmpelsestærskel.

Det skriver landskonsulent Ghita C. Nielsen, Videncentret for Landbrug i PlanteNyt.

Bekæmpelse anbefales derfor generelt, hvor vinterhveden eller vinterbyggen er sået tidligt, og man har meget let ved at finde bladlus på nuværende tidspunkt - og især

hvis man er i milde områder af landet.

Forekomsten af bladlus i vintersæden følges ugentligt landet over, og der er nu fundet bladlus i de fleste lokaliteter - nogen steder en hel del bladlus.

Bladlusene er lettest at se op mod lyset, og de gemmer sig ofte ved basis af bladskederne.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26

Havrerødsot i vinterhvede i foråret fra bladlusangreb i efteråret.

Hveden kan enten være angrebet i små pletter i marken eller i store sammenhængende områder. I hvede bliver de gule blade efterhånden røde, mens der i vinterbyg kun er gule blade i angrebne områder.

Der er ingen bekæmpelsesmuligheder udover at bekæmpe bladlus om efteråret ved kraftige forekomster. (Foto: Morten Ipsen)



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.