

Finpuds strategien mod ukrudt i vintersæd nu

Især problemer med græsukrudt løses gennem både dyrkningsmæssige tiltag og valg af midler.

AF JØRGEN P. JENSEN

Strategien for næste vækstsæsons ukrudtsbekæmpelse lægges som bekendt før høst, hvor man kan bedømme problemukrudtet og vælge våben derefter. Det understreger Videncentret for Landbrug i PlanteNyt.

Nu er etableringen af vintersædsmarkerne godt i gang i det overraskende varme og tørre weekend-



Gold Hejre ses i flere og flere marker og får især gode vækstforhold i sædskifter med meget vintersæd eller reduceret jordbehandling. Gold Hejre går ikke i spirehvile og spirer hurtigt. Forsøg med en overfladisk stubbehandling (maksimum 2-3 centimeters dybde) umiddelbart efter høst, har vist gode effekter mod Gold Hejre. (Foto: Bøje Østerlund)

vejr og ukrudtsstrategien bør tjekkes og tilrettes efter de aktuelle forhold. Med de store nedbørsmængder, der i år er faldet, må man forvente en god jordfugtighed ved såning. Det vil give en god og ensartet fremspiring af kornet, men også en hurtig og massiv fremspiring af ukrudt. Og netop rettidighed ved efterårssprøjtningen skal altid prioriteres højt og i år altså ekstra højt - også selv om den høje jordfugtighed vil gøre effekten af jordmidlerne mere effektiv.

Strategien vil ofte indeholde et miks af dyrkningsmæssige tiltag og nøje valgt herbicidsprøjtning efter ukrudtsart og udsprøjtning tidligt i en dosis efter ukrudtsmængde og ukrudtets størrelse.

Netop disse valg af dosis og herbicid-cocktail bør finpudses helt frem til sprøjte-tidspunktet både af hensyn til bedste effekt og økonomi,

men også til forebyggelse af herbicidresistens i ukrudtet.

Bedst og billigst om efteråret

Efterårsbekæmpelse er oftest bedst og billigst og giver mulighed for en opfølgning til foråret efter behov. Videncentret for Landbrug anbefaler sprøjtning med et jordmiddel, der oftest er en kombination af Boxer, Stomp/Activus og DFF 10-18 dage efter såning på afgrødens stadium 10-11 - lige når sprøjtesporerne er synlige.

Er græsukrudt et af de primære problemer kan forskellige dyrkningsmæssige tiltag hjælpe, mens dyrkningsmæssige tiltag har mindre effekt på tokimbladet ukrudt.

Selvom de fleste tokimbladede ukrudtsfrø vil gå til ved at lade stubmarken ligge urørt, vil der alligevel være en stor andel, der overlever og vedligeholder frøpuljen i jorden.

jjjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.