

Den fugtige sommer har givet mange flere snegle

Angreb af agersnegle i efterårssåede afgrøder kan komme langt hen i efteråret, indtil vi får flere nætter med stærk nattefrost.

AF JØRGEN P. JENSEN

Det er på lerjorde, man skal holde øje med snegleangreb og især i afgrøder efter »fugtige« forfrugter som

vinterraps, frøgræs, kløverfrø, kløvergræs, brak og lignende, oplyser landskonsulent Ghita C. Nielsen, Videncentret for Landbrug i PlanteNyt.

Undersøg gerne stubmarken for snegle også for små, nyudklækkede snegle på få millimeter og eventuelt glas klare snegleæg ved rødderne i stubben. Kan jorden holdes sort efterfølgende ved gentagende harvninger og måske bekæmpelse af kvik og spi-

ret spildplanter hæmmer det sneglene.

Pløjefri dyrkning eller god pakning af jorden straks efter pløjning begrænser hulrum i jorden og derved sneglens gemmesteder.

I vintersæd kan sneglene æde både såsæd og kimplanter og der ses manglende fremspiring i områder med snegle. I vinterraps æder sneglene kun kim- og løvblade.

Bekæmpelse

Rettidig bekæmpelse er alt-afgørende. Erfaringer har vist dårlig eller ingen effekt af for sen bekæmpelse - selv med store mængder sneglemiddel af flere gange.

Sneglemidlerne indeholder ikke lokkemidler, så det tager længere tid, før sneglene finder og æder sneglegranulaterne. Det kan derfor være aktuelt at sprede sneglekorn straks efter så-



Den fugtige sommer har fremmet snegleangreb på lerjorde i de fleste efterårssåede afgrøder som her vinterraps. (Foto: Videncentret for Landbrug)

ning, hvis man ved, at der er mange snegle. lene skjuler sig i jorden inden de dør.

Man ser ingen døde snegle efter behandlingen, da sneg-

j.p.jensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.