

Artikel i Effektivt Landbrug den 1. oktober 2011

## Der er i øjeblikket kun få rapsjordlopper

Planteavlkskonsulen-  
ternes registrering af  
rapsjordlopper viser  
stadic lav forekomst.

AF JØRGEN P. JENSEN



I cirka 80 nysprieede vin-  
terrapsmarker spredt

over hele landet følger plante-  
avlkskonsulenterne forekom-  
sten af rapsjordlopper for at  
kunne varse om et muligt  
bekæmpelsesbehov mod  
rapsjordloppens laver, oplyser  
landskonsulent Ghita C. Niel-  
sen fra Videncentret for Land-  
brug i PlanteNyt.

Der er kun registeret om-  
kring fire procent marker med  
rapsjordlopper og bekæm-  
pesbehovet betegnes derfor  
som meget lavt.

Den landsmæssige registre-  
ring og eventuelle varsling

foretages idet bekæmpelses-  
behovet for larverne ikke kan  
afgøres ud fra, at der er tyde-  
lige gnav i rapsplantens blade  
under fremspiringen. Dette  
gnav kan skyldes de voksne  
rapsjordlopper og bekæm-  
pelse af disse anbefales, når  
minimum 10 procent af bla-  
darealet frem til 4-bladstadiet  
er bortgnavet.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk  
telefon 63 38 25 26



Gnav efter voksne rapsjordlopper viser store afgnåede områder blan-  
det med små, cirkulære huller. (Foto: Videncentret for Landbrug)

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.