

Personlig smitteforebyggelse

Hvad du selv kan gøre for at undgå smitte fra dyr med Q-feber, fugleinfluenza, streptokokker, MRSA, Campylobacter, ringorm m.v. **En milligram gødning kan indeholde millioner af bakterier.**

Grundlæggende gode vaner

- Undlad at bringe ting/fodtøj/tøj fra staldområdet ind i kantinen/stuehuset
- Undlad at "pille" i næsen - brug engangslommetørklæde/vatpind
- Skift til rent arbejdstøj hver morgen
- Vask og tør det beskidte arbejdstøj efter hver arbejdsdag inde i besætningsområdet
- Hold frokoststuen ryddet og ren for støv og snavs
- Brug åndedrætsværn med P3SL eller FFP3SL filtre under højtryksrensning af stalde fra start til slut
- Brug åndedrætsværn med P3SL eller FFP3SL filtre under meget tæt arbejde med dyr, fx aktiv fødselshjælp



Når du vil holde pause

1. Skift overtrækstøj
2. Vask hænderne grundigt med sæbe
3. Tør hænderne i papirhåndklæde
4. Gnid hænderne med ethanolholdig (70- 85 %) sprit med glycerol



Når du vil holde fyraften

1. Læg arbejdstøjet direkte i vaskemaskinen og vask ved 60 grader
2. Lad dit bad omfatte vask af hår
3. Anvend et rent håndklæde
4. Rens fingerneglene
5. Gnid hænderne med ethanolholdig (70- 85 %) sprit med glycerol
6. Tag tøj på, som har ligget i et lukket rum fri for støv

Læs mere: <http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Veterinaert-beredskab/Sider/Qfeber.aspx>

Den Europæiske Union ved Den Europæiske
Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget
i finansieringen af projektet.