

Septoria på observationslisten

■ Der skal nu tælles dage med nedbør for at fastlægge behovet for at bekæmpe Septoria i hvede. Behovet for at bekæmpe Septoria fastlægges ud fra antallet af dage med nedbør fra vækststadium 32 (2. knæ udviklet). I dette vækststadium er 3. øverste blad ved at komme frem og kan smittes. Fra at smitten sker, til symptomer ses, forløber der cirka tre uger.

Det fremgår af Plantenyt nummer 360, der kan læses på DLBR Landbrugsinfo.

I vinterbyg er der udløst bekæmpelse af skoldplet i flere marker.

I triticale skal man fortsat være opmærksom på gulrust i Cando, Dinaro og Korpus. I Ragtac, Tulus og Vuka er der mange steder p.t. ikke bekæmpelsesbehov.

I rug skal eventuel bekæmpelse af skoldplet nu til at afsluttes.

I vårbyg er der ingen eller overvejende svage angreb, mens der i havre er fundet ingen eller kun svage angreb.

I Registreringsnettet for uge 20 fremgår det også, at der i alm. rajgræs er fundet ingen eller overvejende svage angreb. I enkelte marker er der udløst bekæmpelse af kronrust.

Effektivt Landbrug, den 21. maj 2011

ks

Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.