


# Skulpegalmug - risikovurdering

Aktuel risikovurdering for angreb af skulpegalmug i vinterraps baseret på temperaturen i år.

Du kan se risikovurderingen for dit eget område ved at vælge postnr. under figuren.



Århus N (8200)

## Forklaring til modellen og figuren

Skulpegalmuggens larver overvintrer i jorden i marker efter vinter- eller vårraps. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio til ultimo maj - klækkes skulpegalmuggene. Efter at temperaturen har passeret 16 °C, begynder hunnerne at flyve mod vinterrapsmarkerne for at lægge æg. Skulperne begynder efter ca. 1 uge at blive opsvulmede og gullige.

Forudsigelsen af tidspunktet for flyvning baseres på en graddags-model med basistemperatur 8 °C med varsling ved 110 graddage summeret fra den 1. april. Der er dog en vis risiko fra 80 graddage. Modellen siger noget om flyvetidspunkt og ikke om forventet angrebsstyrke, som de senere år har været svage de fleste steder. Derfor er bekæmpelsesomfanget blevet voldsomt nedsat.

Figuren viser risikoen for æglæggende skulpegalmug fra den 1. april for i år. Til sammenligning vises graddage for de to seneste år.

Normalvejret angiver kurvens forventede forløb, hvis vejret svarede til gennemsnittet af årene 1961-1990.

