

Angreb af stankelben i marker efter græs

Der er nu meldt om angreb af stankelben i nogle marker. Der er netop er givet dispensation den 18. maj 2012.

Den senere tid er modtaget flere henvendelser om angreb af stankelben i marker med forfrugt græs. Angreb ses især på lette jorder og humusjorder. Stankelben forpupper sig omkring Sankt Hans, men aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Evt. omsåning tilrådes derfor først omkring 1. uge af juni.

Alle afgrøder angribes, og der er pt. ingen muligheder for kemisk bekæmpelse. Erfaringerne viser, at ærter og majs er lidt mere robuste end de øvrige afgrøder. I majs har udsæd bejdset med special bejdsemidler en del effekt, men udbuddet af sorter og den tilbageværende mængde udsæd er meget begrænset.

De seneste år har Videncentret uden held afsøgt mulighederne for at få virksomme midler tilladt til bekæmpelse af stankelben. ~~Der er også søgt dispensation til at anvende dimethoat, men en afgørelse foreligger endnu ikke.~~ Miljøstyrelsen oplyser den 18. maj 2012, at der netop er givet dispensation til brug af dimethoat produkterne Danadim Progress (400 g/l dimethoat) og Pefekthion 400 EC (400 g/l dimethoat) ved konstateret angreb af stankelbenlarver i græs og vårbyg, havre, vårhvede, kløvergræs og roer efter græs. Se nærmere i [PlanteNyt nr. 602](http://PlanteNyt.nr.602).

Promilleaflgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Billede 1. Tynd plantebestand grundet angreb af stankelben i dette forår. Ofte er der mindst angreb i foragre, hvor jorden er mest fast (foto: Thomas Harbo, Jysk Landbrugsrådgivning).



Billede 2. Nærbillede af stankelbenlarver.

By Rich Haddock