

Hjem > Landdistriktsmidler > 2012 > Optimering > **Anvendelse af overgemt bejdset rapsfrø**

## Anvendelse af overgemt bejdset rapsfrø

*Det anbefales at få udført en spireanalyse, før overgemt bejdset rapsudsæd anvendes.*

Grundet det fugtige efterår 2011 blev der ikke tilsæt så meget vinterraps som forventet. Flere avlere har derfor rapsudsæd fra 2011 liggende.

Det har hidtil været frarådet at anvende overgemt bejdset rapsudsæd grundet ældre erfaringer med unormal spiring. Bayer og Syngenta, som markedsfører bejdsemidler, som findes på det markedsførte frø i Danmark, oplyser dog, at de ikke har betænkeligheder ved at anvende rapsfrø, som er overgemt fra efteråret 2011, såfremt udsæden er opbevaret tørt og køligt. På forespørgsel oplyser Landwirtschaftskammer Slesvig Holsten, at de heller ikke er betænkelige herved ved korrekt opbevaring, og at der kan forekomme en spirenedsettelse på 2-3 procent.

Det anbefales derfor at få udført en spireanalyse, før overgemt bejdset udsæd anvendes.

OK Laboratorium oplyser, at de udfører spireanalyser i raps i spirepapir i 8 dage på samme måde som ved spireanalyser i korn. Der er hidtil kun udført relativ få analyser, og OK Laboratorium har ikke hidtil lagt mærke til unormale spirer, men der er meget stor forskel i spireprocenten mellem de indsendte prøver. OK Laboratorium vurderer, at de fleste af prøverne har været overgemt bejdset udsæd.

**By Rich Haddock**

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.