



Goldfodsyge ses i nogle vinterhvedemarker

Når rødderne vaskes grundigt i vand, kan det afgøres, om goldfodsyge er årsag til, at bladene områdevis visner.

Den senere tid er set angreb af goldfodsyge i flere hvedemarker med forfrugt korn. Områdevis i marken visner bladene, og ofte er planterne i de nødmodne områder lavere, så symptomerne kan minde om angreb af havrerødsot, men de røde bladspidser, som ses ved havrerødsot, mangler.

Når rødderne vaskes grundet i vand, kan de sorte rødder ses. Sæt evt. rødderne i vand med klorin en halv times tid, efter at rødderne er vasket, for at se symptomerne tydeligt.

I marker med angreb ses tit også, at der er mindre angreb ved gødningsoverlap.

Symptomerne kan - i områder med tidligere lidt nedbør - forveksles med tørke.

Som i tidligere år kan der købes udsæd af forskellige vinterhvedesorter, der er Latitude-bejdsede. Merprisen er ca. 150-200 kr. pr. hkg. Latitude-bejdsningen er primært aktuel i 2. og 3. års hvedemarker samt efter flere års korndyrkning, hvor der sås tidligere end omkring den 20.- 25. september. Latitude udsætter angrebet af goldfodsyge, men bekæmper ikke svampen fuldstændig. Latitude udsætter angrebet af goldfodsyge, men bekæmper ikke svampen fuldstændig.



Billede 1. Plet med angreb af goldfodsyge fotograferet 27. juni. Planterne er områdevis lavere, og bladene visner.



Billede 2. Rødder fra samme plet som billede 1. Rødderne er rensset og en tydelig sortfarvning af goldfodsyge ses. Ved mikroskopi er svampens løbehyfer, se indsat billede til højre.

By Rich Haddock

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.