

Bekæmpelsestærskler for skadedyr

Nedenfor ses en oversigt over vejledende bekæmpelsestærskler for skadedyr i landbrugsafgrøder. Tærsklerne i korn er fra Planteværn Online og disse tærskler er relativt godt belyst. De øvrige bekæmpelsestærskler er anslået og må derfor betragtes som vejledende.

Vejledende bekæmpelsestærskler 2013

Korn

Bladlus

Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 73: 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke er behov for svampebekæmpelse.

Vinterhvede og vårsæd frem til og med vækststadium 73: 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse.

Vinterhvede og vårsæd vækststadium 74-75: 100 procent angrebne strå. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister.

Kornbladbiller

0,5-1,0 larve pr. aksbærende strå.

Hvedegalmyg

Fangst af over 120 hvedegalmyg pr. dag i opstillede feromonfælder, såfremt hveden er i det modtagelige vækststadium (begyndende skridning til begyndende blomstring). Fanges der over 30 hvedegalmyg pr. dag, er der også en vis risiko, men det er mere usikkert, om sprøjtningen bliver rentabel.

Rug og triticales

Trips

1 mørk trips pr. bladskede. Bekæmpelse skal udføres lige før begyndende skridning i v.s. 45.

Ærter

Bladrandbiller

Gennemsnitligt mere end 1 gnav pr. plante i de tidlige vækststadier.

Ærtebladlus

15-20 pct. angrebne planter. Afblostring og fuld bælg længde: Over 50 pct. angrebne planter.

Skyggeviklere




Bladlus i hvede.



Hvedegalmyg i feromonfælde.



Trips i rug.



Ærtebladlus.

5-10 pct. sammenviklede topkud før blomstring.



Skyggeviklerlarve.

Kløverudlæg

Bladrandbiller

Svagt udviklet kløver: 20 pct. angrebne planter.

Kraftigt udviklet kløver: Bekæmpelse sjældent aktuel.



Bladrandbille i hestebønner.

Bederoer

Ferskenbladlus

Ved konstateret forekomst.



Ferskenbladlus

Bedebladlus

Over 50 pct. angrebne planter og begyndende kolonidannelse (en koloni er mindst 10 bladlus).



Bedebladlus
Foto: Anne Lisbeth Hansen

Uglelarver

4-5 larver pr. plante.



Uglelarve.

Vårraps

Glimmerbøsser

Tidligt knopstadium: 1,0 bille pr. plante. Sent knopstadium: 3,0 biller pr. plante.



Glimmerbøsser.
Foto: Erik Nygaard Pedersen, LandboMidtØst

Vinterraps

Rapsjordlopper

De voksne bekæmpes ved over 10 procent bortgravet bladareal frem til og med 4 løvbladstadiet.

Bekæmpelse rettet mod larver udføres ved en fangst af 25 rapsjordlopper indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden i gule fangbakker (radius 11 cm, areal ca. 380 cm²). Der anvendes ca. 2 fangbakker pr. 10 ha.



Rapsjordlopper i gul fangbakke.

Glimmerbøsser

Tidligt knopstadium: 3,0 biller pr. plante.

Sent knopstadium: 5,0-6,0 biller pr. plante.

Ved begyndende blomstring: over 20 biller pr. plante.



Glimmerbøsser.
Foto: Erik Nygaard
Pedersen,
LandboMidtØst

Skulpegalmyg

Ved begyndende flyvning. Kun ved erfaring for kraftige angreb.



Skulpegalmyg.

Skulpesnudebiller

6,0 biller pr. plante fra begyndende blomstring.



Skulpesnudebille.
Foto: Erik Nygaard
Pedersen,
LandboMidtØst