

Svampebekæmpelse i raps er en forsikringsoprøjtning

Behovet for svampebekæmpelse i vinter-raps kan være svært at afgøre og må i et vist omfang stadig betragtes som en forsikringsoprøjtning.

Der findes stadig ikke noget godt hjælpemiddel til at afgøre behovet for svampebekæmpelse i vinter-raps under blomstring, fremgår det af PlanteNyt 571 på Landbrugsinfo.

I tabellen ses hvilke forhold, der fremmer svampeangreb. Sidste »knoldbægersvamp« var i 2007, men angrebene varierede meget fra mark til mark. Der er derfor grund til især at være opmærksom på vinterrapsmarker, hvor der også var raps med angreb i 2007.

Både knoldbægersvamp, gråskimmel og skulpesvamp fremmes af nedbør, mens angreb af skulpesvamp ikke er særlig afhængig af sædskiftet

og blomstringens varighed. Skulpesvamp trives bedst ved høje temperaturer, 17-25 grader.

Bekæmpelsesbehov?

Gråskimmel fremmes også af nedbør, men er især en svækelsesparasit, som angriber svækkede planter. I år optræder gråskimmel i større omfang end ellers.

I år optræder der også mere udbredte angreb af lys bladplet i nogle marker. Ved me-

gen lys bladplet foretrækkes løsninger med effekt mod lys bladplet for eksempel løsninger indeholdende Folicur/Orius.

65 procent rentable

Af i alt 84 landsforsøg med svampesprøjtning i vinterraps under blomstring i 1998-2011 har cirka 65 procent været rentable ved en rapspris på omkring 320 kroner pr. hkg. Det gennemsnitlige bruttoerudbytte har været 1,7 hkg



Ved svampebekæmpelse omkring blomstring kan der opnås forebyggende effekt mod knoldbægersvamp, skulpesvamp, gråskimmel og lys bladplet. (Arkivfoto: Kaj Lund Sørensen)

pr. hektar og med 6,7 hkg pr. hektar som det højeste bruttoerudbytte.

Ved svampebekæmpelse omkring blomstring opnås der forebyggende effekt mod knoldbægersvamp, skulpe-

svamp, gråskimmel og lys bladplet. Mod de synlige angreb af gråskimmel, som findes i flere marker på nuværende tidspunkt, opnås ikke effekt.

kl



Landdistrikter.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Landbruksfond for Udvikling af Landdistrikterne

Danmark og EU's medlemslanddistrikter

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

FORHOLD DER FREMMER HENHOLDSVIS HÆMMER SVAMPE I RAPS

Høj risiko

Nedbør op til, under og lige efter blomstring

Rapsdyrkning hvert 3.-5. år

Lang blomstring

Lav risiko

Tørt op til, under og lige efter blomstring

Rapsdyrkning hvert 6. år eller sjældnere

Kort blomstring

(Kilde: Landbrugsinfo)

