

Ukrudtsbekæmpelse i ærter giver ikke merudbytte

Ukrudtsbekæmpelse i ærter er primært rettet mod at undgå høstbesvær og opformering af ukrudt.

AF JØRGEN P. JENSEN

Forvent ikke at få et net-
to merudbytte for at
bekæmpe ukrudt i ærter.

Målet er primært at opnå en så effektiv bekæmpelse, at restukrudt ikke bliver til besvær ved høst, eller at der sker en opformering af ukrudt. Det skriver Videncentret for Landbrug.

De gennemførte forsøg har vist, at en enkelt behandling med nedsat dosis ofte giver tilstrækkelig effekt. På area-

ler med en lille til moderat ukrudtsbestand bør der sættes på en enkelt behandling med cirka halv normaldosering - svarende til den ene splitbehandling. Ved stor ukrudtsbestand kan det anbefales at planlægge efter den traditionelle splitsprøjtning eller én behandling med Fenix plus Fighter 480, når ærterne er 4-5 cm høje.

Glyphosat kan anvendes til høsthjælp, hvis der er bundukrudt, som vil genere høsten. Glyphosat må dog ikke anvendes på fremavlsarealer eller arealer med udlæg.

Se på ukrudtet hvornår der skal sprøjtes

Bekæmp ukrudtet på kimbladsstadiet uden hensyn til ærternes størrelse.

Mod vanskelige arter som vejpileurt, raps og gul okseøj er det vigtigt, at ingen af ukrudtsplanterne når at udvikle løvblade inden sprøjtning. Hvis nyt ukrudt spirer senere frem i en mængde, der vil kunne volde høstbesvær, sprøjtes der igen 10-14 dage senere. Afsæt 1-2 m ubehandlet sprøjtevindue, så det er muligt at vurdere effekten af første sprøjtning, før der tages beslutning om en eventuel opfølgning.

Hvis det rette tidspunkt for en tidlig behandling bliver forpasset, er Fenix plus Fighter 480 den mest sikre løsning.

En sprøjtning med Fenix plus Fighter 480 kan også være aktuel, hvis fremspiringen af ukrudt sker over en lang pe-

riode på grund af tørre forhold efter såning. Fenix kan ikke blandes med Basagran M75. I ærter med udlæg af græs/kløvergræs eller frøgræs er Fighter 480, Basagran M75 og Stomp skånsomme. For at undgå, at Stomp påvirker udlægget, skal det sås, så frøene er dækket. Hverken kløver- eller græsudlæg tåler Fenix.

Tilpas dosis efter klimaforholdene

God jordfugtighed giver ide-

lle virkningsbetingelser. Det er optimalt med 15-20 grader Celcius ved brug af Fighter eller Basagran M75, men ofte opnås god effekt, selv om temperaturen er betydeligt lavere.

Planternes vokslag afhænger af de aktuelle vejrforhold. Både afgrøde og ukrudt udvikler et tyndt vokslag, når vækstbetingelserne er gode, hvilket vil sige grødevej, fugtig jord, høj luftfugtighed og hurtig plantevækst.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26



Ukrudtsplanternes størrelse afgør, hvornår der skal ukrudtssprøjtes i ærterne. Gør det så vidt muligt på ukrudtsplanternes kimbladsstadiet. (Foto: Vagn I. Pertl).