

Stadig bedre at forebygge end at helbrede

Planlæg ukrudtsbekæmpelsen så du både forebygger opformering af ukrudt og udvikling af herbicidresistens.

AF JØRGEN P. JENSEN

 Det bliver stadig mere og mere kompliceret at skrue den rigtige planlægning af den kommende sæsons ukrudtssprøjtning sammen. Der er mange hensyn at tage i valg af midler, nye afgifter og ikke mindst hensyn til at undgå udvikling af herbicidresistens.

De senere års stigende resistens mod blandt andet agerrævehale og rajgræs understreger, at det er vigtigt både at vælge midler med forskellig virkningsmekanisme og samtidig vælge en effektiv dosering.

Men mest genialt er det naturligvis slet ikke at have problem med ukrudt - så vidt det er muligt. Videncentret for Landbrug har udarbejdet en aktuel liste over tiltag, som forebygger opformering af ukrudt.

*jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26*

Sådan mindskes ukrudtsbestanden

- God etablering betyder, at afgrøden har god konkurrenceevne mod ukrudtet.
- Vårsæd forhindrer mere eller mindre de fleste græsser i at sætte frø. Enårig rapgræs, italiensk rajgræs og agerrævehale har dog en vis forårsfremspiring, og frøene kan nå at modne.
- Udsættelse af såtidspunkt giver generelt mindre fremspiring af ukrudt.
- Vinterbyg, vinterrug og tritcale har større konkurrenceevne mod ukrudt end hvede. Vinterrug er den bedste konkurrent af vintersædsarterne.
- Udsædsmængde bestemmes i forhold til såtidspunkt. Normalt er det ikke så relevant at udnytte, at øget plantetal giver bedre konkurrence mod ukrudt, men på arealer med vanskelige arter som agerrævehale og italiensk rajgræs bør udsædsmængden øges.
- Urørt stub i så lang tid som muligt giver størst dødelighed for både frø af græsukrudt og de fleste andre ukrudtsfrø. En undtagelse er gold hejre.
- Øverlig stubhævning på maksimalt tre cm lige efter høst får gold hejre til at spire.
- Beskyt markkanter og diger mod ukrudtsmidler og gødning, så der opstår en stabil græskant, som ikke giver plads til burresnerre, gold hejre med flere.
- Slå rabatterne, hvis der vokser uønskede ukrudtsarter - hvis det er tilladt.
- Sprøjt forageren til sidst, så filmen af jordmiddel ikke brydes, når der vendes med sprøjten.
- Øg doseringen af ukrudtsmidler i forageren, hvor afgrøden ofte er mere åben, og dermed ikke yder ukrudtet så god konkurrence.
- Pletter med meget ukrudt høstes, og halmen presses om muligt for sig, så ukrudtsfrøene ikke spredes yderligere.
- Rengør mejetærsker og halmpresser, så spredning mellem marker og ejendomme begrænses.
- Lad spildfrø af frøgræs ligge urørt i stubben så længe som muligt og etablér en vårafgrøde efter frøgræs.

Kilde: Videncentret for Landbrug

