

Kan vinterrapsen tåle forfrugtens ukrudtsmiddel?

Vær opmærksom på, at der for nogle ukrudtsmidler anvendt i forfrugten er forbehold, når den efterfølgende afgrøde er vinterraps.

AF JØRGEN P. JENSEN

En række ukrudtsmidler i korn har så megen jordvirkning, at der er nogle begrænsninger, når der efterfølgende sås en følsom afgrøde som vinterraps, påpeger Videncentret for Landbrug. Herunder er nævnt en række ukrudtsmidler, som man især skal være opmærksom på.

Monitor

På etiketten anbefales der ofte en pløjning for at minimere risikoen for afgrødeskade. Normalt vil en grundig, dyb harvning kunne erstatte pløjning.

Der er set flere afgrødeskader, hvor der er sået vinterraps uden pløjning, også hvor der er etableret raps ved grubbesåning. Det kan derfor ikke anbefales at så vinterraps med grubbesåning - uden først at harve de arealer, der er sprøjtet med Monitor. Jorden blandes ikke nok, når der sås direkte i stubben.

Hussar OD

Hussar OD nedbrydes hurtigt i fugtig jord og en grundig harvning er tilstrækkeligt under normale forhold.

Efter en tør sommer anbefales pløjning forud for vinterraps. Der kan være risiko for påvirkning af rapsen, når etablering sker ved grubbesåning uden forudgående harvning. Det kan derfor tilrådes at harve lige efter høsten.

DFF eller Diflufenican

Hvis DFF er brugt i foråret, anbefales pløjning før såning af vinterraps.

En grundig harvning kan sidestilles med pløjning.

Atlantis OD, Broadway og Mustang Forte

Indholdet af iodosulfuron (aktivstoffet i Hussar OD) i Atlantis OD er så lavt, at der ikke er forbehold ved såning af vinterraps.

Der er ingen restriktioner for efterfølgende afgrøde efter behandling med Broadway.

Der er ingen restriktioner for etablering af vinterraps, når det gælder Mustang Forte.

j.p.jensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 26

Forfrugtens ukrudtsmidler, som kan skade vinterraps

Aktivstof	Middel ¹⁾	Forbehold på etikette	Praksis
Diflufenican	DFF, Diflanil, Legacy, Semptra	Pløjning anbefales	Ingen rapporter om skade. Risiko er lav ved nedsat dosis og normale jordfugtighedsforhold hen over sommeren. En tør sommer kan betyde langsom nedbrydning af DFF.
Diflufenican + flupyralsulfuron	Absolute 5	Pløjning anbefales	
Diflufenican + mesosulfuron + iodosulfuron	Othello	Pløjning anbefales	
Iodosulfuron	Hussar OD	Grundig harvning efter normal sommer, pløjning efter en tør sommer.	Ingen bemærkninger.
Metsulfuron	Ally ST, Accurate, Finy, MiniMet, Nicanor m.fl.	Hvis der er anvendt mere end 1,07 tab. Ally ST eller mere end 20 g pr. ha af øvrige midler, kan der ikke sås raps inden for 6 måneder efter sprøjtning.	I praksis er der ikke set skader. Loftet for dosis med hensyn til forbeholdet er fastsat med en god sikkerhedsmargin.
Sulfosulfuron	Monitor	Der skal foretages grundig og dyb jordbearbejdning.	Flere eksempler på kraftig hæmning af raps ved for overfladisk harvning.
Triasulfuron	Zoom	Dyb og grundig jordbearbejdning eller pløjning.	Ingen bemærkninger.

¹⁾ Ikke alle parallelprodukter er nævnt. Produkter med samme aktivstoffer vil have tilsvarende

Kilde: Videncentret for Landbrug