

Rodukrudt i stub kan også bekæmpes i begyndelsen af oktober

Selv om de nye regler for jordbearbejdning først tillader brug af glyphosat forud for vårafgrøder efter den 1. oktober, er det stadig relevant at bekæmpe rodukrudd i stub, oplyser Videncentret.

 I en eftersommer med høj jordfugtighed vil rodukrudd som tidsler, grå bynke, svinemælk og følfod have gode vækstbetingelser, så de udvikler tilstrækkeligt store skud til, at de kan sende glyphosat ned i de underjordiske organer.

- Det giver mulighed for at

opnå en høj effekt af en sprøjtning med glyphosat i løbet af september og første del af oktober, fortæller landskonsulent Poul Henning Petersen, Videncentret for Landbrug, og fortsætter:

- Man bør være opmærksom på, om ukrudtet er i aktiv vækst på sprøjtetidspunktet. Kvik skal have udviklet 3-4 blade før planten sender saftstrømmen og dermed glyphosat ned i udløberne. Det stadium vil normalt være nået midt i september.

Nye regler for behandling i stub

De nye regler omkring jordbe-

arbejdning og anvendelse af glyphosat, som trådte i kraft efter høst 2011, betyder, at rodukrudd først må bekæmpes fra 1. oktober på arealer, hvor der skal etableres vårafgrøder.

- Det er vores vurdering, at det ved sprøjtning først i oktober stadig er muligt at opnå rigtig god effekt, siger Poul Henning Petersen. Ved bekæmpelse af kvik gør det ikke noget, at der sprøjtes efter den første nattefrost. Noget tyder på, at lidt nattefrost faktisk sætter yderligere skub i transporten ned i udløberne, og dermed medvirker til god langtidseffekt.

Rodukrudtet vokser ofte i af-

grænsede pletter eller - som især grå bynke - langs skel og vejkanter. I stubben vil der ofte være gode muligheder for at udføre plet- eller randbehandling, oplyser landskonsulenten.

Sprøjteteknik

- Brug en lav vandmængde med maksimalt 150 liter pr. hektar, så der opnås optimal effekt, oplyser Poul Henning Petersen.

- Man bør bruge lavdriftsdyser, kompakte injektionsdyser eller eventuelt injektordyser for at undgå afdrift af glyphosat-midler til markens kanter. Herved bevares flerårige græs-



Lige før høst er det nemt at se det besværlige rodukrudd, som passende kan bekæmpes først i oktober i stubben. Her er det gråbynker. (Foto: Kaj Lund Sørensen)

ser og urter, som vil hindre opformering af for eksempel burresnerre, væselhale og gold hejre.

Morgensprøjtning på dage med udsigt til sol vil være perfekt sprøjteforhold, hvis der ikke er kraftig dug på planterne, fremgår det.

For at opnå størst mulig effekt, skal man først pløje eller lave anden form for jordbe-

arbejdning et vist antal dage efter sprøjtningen, hvilket vil sige 7-10 dage efter sprøjtning med glyphosat tidligt på efteråret, og 10-14 dage efter sprøjtning med glyphosat sidst på efteråret.

Det korteste interval gælder under gode temperaturforhold og høj lysindstråling.