

Hjem > Landdistriktsmidler > 2012 > Optimering > **Se efter trips i rug og triticale**

Se efter trips i rug og triticale

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan dette resultere i, at bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved fund af mere end én trips pr. bladskede.

Ved begyndende skridning af rug og triticale skal marken kontrolleres for angreb af trips. Vurder angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder **under** bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end én mørk trips pr. bladskede.

Vinterbyg kan også skades, men oftest optræder der kun få trips i vinterbyg.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. hektar Karate 2,5 WG eller 0,15 l pr. hektar Cyperb 100.



Billede 1. Trips i triticale. Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.



Billede 2. Trips i bladskeden.



Billede 3. Brunfarvede faneblade og bladskeder efter tripsangreb.

By Rich Haddock

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.