



Hjem > Landdistriktsmidler > 2012 > Ny viden til økologisk jordbrug > Grafik over omlægning til økologisk kødkvægsproduktion

Grafik over omlægning til økologisk kødkvægsproduktion


To modeller for omlægningsforløb for økologiske ammeko- eller kødkvægsproducenter.

Valg af omlægningstidspunkt og model for omlægning har afgørende betydning for, hvornår forskellige afgrøder kan bruges som foder til dyrene på bedriften, og hvornår dyrene kan slagtes som økologiske. I økologireglerne er der en "almindelig" model for omlægning af en kvægbedrift og en model med samtidig omlægning, hvor der gælder helt specielle regler for brug af foder fra bedriften.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Omlægning til økologisk kødkvægsproduktion den 1. april 2013



Promilleafgiftsfonden for landbrug

Udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økologi
(Klik på figuren for stor udgave)

Omlægningstidspunktet den 1. april er valgt af hensyn til omlægning af græsmarkerne og udbindingstidspunktet for dyrene. Der kan opstilles nogle enkelte fordele og ulemper for valg af denne model for omlægning - se tabel 1.

Hvis omlægningstidspunktet for dyrene udskydes til den 1. august eller 1. september 2014, kan foder, der høstes efter 1. april 2014, bruges med 100 pct. i foderrationen, men den samlede omlægningstid for kødet kan sælges som økologisk vil blive forlænget.

Tabel 1. Fordele og ulemper ved en "almindelig" omlægning


Fordele

- Omlægningstidspunktet for kvæg er fleksibelt og kan tilpasses eventuelle foderbeholdninger på bedriften (ændringer skal indberettes fremadrettet).
- Konventionelle dyr kan frit indkøbes indtil omlægning af kvæget påbegyndes.
- Græs, lucerne og proteinafgrøder, der høstes i første omlægningstid (0-12 mdr. fra omlægning), kan bruges med 20 pct. af foderrationen efter omlægning af dyrene.

Ulemper

- Majs eller helsæd, der er høstet i første omlægningstid, må ikke bruges efter omlægning af dyrene. Hvilket kan betyde større indkøb af foder.
- Dyr, der skal slagtes som økologiske, skal have levet hele deres liv eller 12 mdr. og mindst ¾ af deres liv som økologiske. Fx kan en kvie, der er 2 år gammel ved omlægningens start, først slagtes som økologisk efter 6 år (6/8 år)

Samtidig omlægning til økologisk kødkvægsproduktion den 1. april 2013



Udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økologi
(Klik på figuren for stor udgave)

Tabel 2. Fordele og ulemper ved en "samtidig" omlægning

Fordele

- Alle dyr kan slagtes som økologiske efter 24 mdr.
- Alt foder, der er produceret på bedriften både før og efter omlægningens start, kan bruges ubegrænset til egne dyr i de første 24 mdr.
- Alt foder, der er produceret på bedriften efter omlægningens start, kan også bruges ubegrænset til egne dyr efter de 24 mdr.

Ulemper

- Omlægningsdatoen for kvæg er ikke fleksibel, og perioden på de 24 mdr. kan ikke flyttes.
- Indkøb af dyr i 24 mdr. perioden er besværlig.
- I nogle tilfælde kan den "almindelige" omlægning ske hurtigere (fx på 18 mdr.).