



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Formidling og demo af ny viden > Goldfodsyge ses i nogle vinterhvedemarker

Goldfodsyge ses i nogle vinterhvedemarker

Når rødderne vaskes grundigt i vand, kan det afgøres, om goldfodsyge er årsag til, at bladene visner områdevis i marken.

Den senere tid er set angreb af goldfodsyge i flere hvedemarker med forfrugt korn. Områdevis i marken visner bladene, og ofte er planterne i de nødmodne områder lavere, så symptomerne kan minde om angreb af havrerødsot, men de røde bladspidser, som ses ved havrerødsot, mangler.

Når rødderne vaskes grundet i vand, kan de sorte rødder ses. Sæt evt. rødderne i vand med klorin en halv times tid, efter at rødderne er vasket, for at se symptomerne tydeligt.

I marker med angreb ses tit også, at der er mindre angreb ved gødningsoverlap.

Som i tidligere år kan der købes udsæd af forskellige vinterhvedesorter, der er Latitude-bejdsede. Merprisen er ca. 175 kr. pr. hkg. Tjek dosis af Latitude, når du køber udsæd bejdsat med Latitude. 200 ml pr. hkg anbefales. Se nærmere i [plantenyt nr. 436, 2011](#).

Latitude-bejdsningen er primært aktuel i 2. og 3. års hvedemarker samt efter flere års korndyrkning, hvor der sås tidligere end omkring den 20.- 25. september. Se merudbytte for bejdsning i landsforsøgene i [planteavlsoverorientering 09-860](#).



Billede 1. Plet med angreb af goldfodsyge. Planterne er områdevis lavere, og bladene visner.



Billede 2. Rødder fra samme plet som billede 1. Rødderne er rensset, og en tydelig sortfarvning forårsaget af goldfodsyge ses. Ved mikroskopiering ses svampens løbehyfer, se indsat billede til højre.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'