



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Formidling og demo af ny viden > Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i byg-, ærte- og byg/ærtehelsæd

I bygghelsæd kan svampe- og skadedyrsbekæmpelse være aktuel ved angreb over de vejledende bekæmpelsestærskler. Vær opmærksom på midlernes sprøjtefrister. I helsæd med ærter er kun Amistar og Mirador SC godkendt.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

Byghelsæd

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i bygghelsæd kan være nødvendig ved mere udbredte angreb. De samme vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme og skadedyr i korn til modenhed kan anvendes i bygghelsæd. Se "[Vejledende bekæmpelsestærskler for svampesygdomme i korn](#)" og "[Vejledende bekæmpelsestærskler for skadedyr](#)". Se også svampemidlernes effekt i "[Svampemidler i korn](#)".

Ved bekæmpelse af svampe og skadedyr i helsæd skal man være opmærksom på midlernes sprøjtefrister. En oversigt over sprøjtefrister i vårbyg ses i tabel 1. Den korteste sprøjtefrist på 21 dage har Amistar og Mirador 250 SC. Af skadedyrsmidler har Cyperb 100/100 EW, Cythrin 500 og Nexide CS de korteste sprøjtefrister på 21 dage.

Tabel 1. Oversigt over sprøjtefrister for svampe- og skadedyrsmidler i vårbyg.

Svampemiddel	Sprøjtefrist
Amistar/Mirador 250 SC	42 dage, men 21 dage i korn til helsæd
Approach	35 dage
Bell	35 dage
Bumper 25 EC/ Tilt 250EC	St. 65
Ceando	35 dage
Comet	42 dage
Flexity	35 dage
Folicur EC 250/Orius 200 EW	6 uger, men senest i st. 65
Juventus 90	35 dage
Opera	42 dage
Opus/Rubric/Maredo 125 SC	5 uger
Osiris	49 dage
Proline EC 250	35 dage
Prosaro 250 EC	35 dage
Stereo 312,5 EC	45 dage
Tern	St. 51
Viverda	St. 65
Zenit 575 EC	6 uger, men senest i st. 65
Skadedyrsmidler	Sprøjtefrist
Cyperb 100/100 W	21 dage
Cythrin 500	21 dage
Fastac 50	42 dage
Karate 2,5 WG	30 dage
Mavrik 2F	28 dage
Nexide CS	21 dage
Pirimor	30 dage

I tabel 2 ses nogle af de mest udbredte vårbygssorters modtagelighed over for svampesygdomme.

Tabel 2. Nogle af de mest udbredte vårbygssorters modtagelighed over for svampesygdomme (SortInfo).

Sort	Meldug Bygrust (-1-3)•	(0-3)•	Bygbladplet (0-3)•	Skoldplet Ramularia (0-3)•	(0-3)•
Quench	-1	3	0	2	3
Propino	2	3	0	1	2
Evergreen	0	1	1	1	2
TamTam	0	3	2	2	2
Shuffle	0	3	-	1	2
Columbus	0	2	1	3	2
Rosalina	-1	3	2	3	3
Simba	-1	1	2	1	3
Cheers	0	2	-	2	2
Chapeau	0	3	-	2	3
Chill	0	3	1	2	3

• 0-3 skala, hvor 0 er ikke modtagelig og 3 er meget modtagelig. -1= mlo-resistens mod meldug.
- = manglede data

Byg/ærtehelsæd

Kun svampemidlet Amistar/Mirador 250 SC er godkendt til brug i både korn og ærter. Sprøjtefristen er i byg/ærtehelsæd 21 dage. Amistar/Mirador 250SC har god effekt mod bygrust og nogen effekt mod bygbladplet, men har kun meget begrænset effekt mod meldug og skoldplet. Alle skadedyrsmidler, der er godkendt i både byg er også godkendt i ærter. Mavrik må dog ikke bruges i ærtehelsæd, da bælgene fra friske ærter ikke må opfodres. Cyperb 100/100 W og Nexide CS har den korteste sprøjtefrist på 21 dage.

Ærtehelsæd

Svampebekæmpelse anbefales generelt ikke i ærtehelsæd.

Den vejledende bekæmpelsestærskel for ærtebladlus er 15-20 procent angrebne planter, og ved afblomstring og fuld bælgelængde over 50 procent

angrebne planter. Sprøjtefristen for Pirimor er 3 dage. Fastac 50 har en sprøjtefrist på 7 dage. Cyperb 100/100W, Cythrin 500, Nexide CS og Karate 2,5 WG har en sprøjtefrist på 14 dage i ærter.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.