



Svampebekæmpelse i rug

Strategi for eventuel svampebekæmpelse i rug beskrives. Rug kan angribes af meldug, skoldplet og brunrust. Selv ret sene angreb af brunrust kan være tabsvoldende.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Knækkefodsyge

Bekæmpelse af knækkefodsyge anbefales kun undtagelsesvis, hvor der er et anstrengt kornsædskifte, sået tidligt og en meget kraftig plantebestand. Læs mere i [Plantenyt 759](#). I tabel 2 nedenfor er også angivet løsningsforslag mod knækkefodsyge.



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

Sorternes modtagelighed

I tabel 1 ses de dyrkede sorters modtagelighed mod bladsvampe. Sorterne Evolo og Visello er mest modtagelige for brunrust, men derudover er der ikke den store forskel på sorternes modtagelighed.

Tabel 1. De dyrkede rugsorters modtagelighed mod svampe.

Sort	Procent af rugareal 2013	Meldug (0-3) *	Skoldplet (0-3) *	Brunrust (0-3) *	Brunrust, pct. dækning 5 lok. 2012
Palazzo	59,6	2	2	2	11
KWS-Magnifico	16,4	2	2	2	14
Evolo (lidt Palazzo iblandet)	12,0	2	2	3	17
Kapitän	7,9	2	2	2	9
Visello**	2,8	2	2	3	-

* 0 = ikke modtagelig, 3 = meget modtagelig, ** = sygdomsdata fra 2011.

Meldug bekæmpes i vækststadium 31- 59 (1. knæ udviklet til fuld gennemskridning) ved over 50 pct. angrebne planter.

Skoldplet bekæmpes i vækststadium 37-59 (fanebladet synligt til fuld gennemskridning) efter en periode med fugtige forhold, og når angrebet breder sig op ad planterne.

Brunrust bekæmpes, hvis der er over 10 pct. angrebne planter. Brunrust er den mest tabsgivende svampesygdom i rug, og selv ret sene angreb kan være tabsvoldende. Det er derfor vigtigt at vurdere behovet for en evt. sen bekæmpelse af brunrust omkring 1. juni.

Løsningsforslag

I [tabel 2](#) ses løsningsforslag ved bekæmpelsesbehov. I starten (angivet som til og med vækststadium 32) er også angivet løsninger mod knækkefodsyge, selv om bekæmpelse sjældent er aktuel.

Mod bladsvampe er i vækststadium 31- 59 angivet 25 procent normaldosering, som hæves ved mere udbredte angreb på sprøjtetidspunktet. De angivne løsninger i vækststadium 59-65 er rettet mod brunrust, og dosis er hævet til 35 procent normaldosering for at få en længere virkningstid. Følgende midler har bedst effekt mod brunrust: Folicur/Orius, Rubric/Opus/Maredo, Ceando, Bell, Viverda og Opera.



Billede 1. Meldug i rug.



Billede 2. Skoldplet i rug. Bladpletterne er lysere end ved skoldplet i byg.



Billede 3. Brunrust i rug.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.