



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Formidling og demo af ny viden > Se efter trips i rug og triticale

Se efter trips i rug og triticale

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved mere end 1 trips pr. bladskede.

Ved begyndende skridning af rug og triticale skal marken kontrolleres for angreb af trips. Vurdér angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder **under** bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 1 mørk trips pr. bladskede.

Vinterbyg kan også skades, men oftest optræder der kun få trips i vinterbyg.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Karate 2,5 WG eller 0,15 l pr. ha Cyperb 100/Cyperb 100 W eller 0,04 l pr. ha Cythrin.



Billede 1. Trips i triticale.

Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.



Billede 2. Trips i bladskeden.



Billede 3. Brunfarvede faneblade og bladskeder efter tripsangreb.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

