



For dyrt at bekæmpe stankelben

Der er givet dispensation til at bruge Danadim Progress mod stankelben i græs i efteråret, men den samlede omkostning til bekæmpelse vil beløbe sig til 2.128 kr. pr. ha på grund af den nye afgift.

I den senere tid er der modtaget flere henvendelser om stankelben, der ligger æg i græsmarker.

I foråret 2013 blev der som bekendt givet dispensation til brug af dimethoat (Danadim Progress og Perfekthion 400 EC) mod stankelbenlarver i græs og kløvergræs og i flere afgrøder efter græs. Læs mere i [artikel 1285](#).

Videncentret har igen søgt dispensation til anvendelse af Danadim Progress i efteråret 2013. Miljøstyrelsen har netop meddelt, at dispensationen er givet. Desværre har det ikke været muligt at undgå den nye høje afgift, som er 964 kr. pr. liter. Der skal bruges 2,0 l pr. ha, og produktprisen er omkring 100 kr. pr. l, så den samlede omkostning til bekæmpelse vil beløbe sig til 2.128 kr. pr. ha. Under disse omstændigheder har Cheminova valgt ikke at markedsføre midlet.

Der er ikke udsigt til andre kemiske løsninger. Det biologiske middel **Vectobac 12 AS** er fortsat tilladt, men effekten er meget svingende, og produktet er ret dyrt. Doseringen er 2,5 l pr. ha, og gentagen bekæmpelse kan være nødvendig. Prisen er 180 kr. pr. liter inkl. afgift og ekskl. moms. Efterårsbekæmpelse har bedst effekt, og fugtig jord og mindst 400 l vand pr. ha - og helst mere - er strengt nødvendigt. Sprøjtning i regnvejr er en fordel. Firmaet oplyser, at de kun har begrænsede mængder på lager, og at der er en leveringstid på to måneder for yderligere mængder.

Udsatte marker

Stankelbenene ligger æg i græs i august til primo september. Kort græs foretrækkes. Den mest effektive forebyggelsesmetode er således at undgå græs i august til primo september, hvilket ikke er muligt af flere årsager.

Normalt findes der flest stankelben i 2. og 3. års græsmarker, der har været afgræsset. Larverne er mest udbredt på humus-, sand- og marskjerder.

Kraftig æglægning behøver ikke resultere i kraftige angreb af larver. Æg og larver kræver fugtige forhold om efteråret, men hæmmes ved vandstand o. lign. i marken. Tørre forhold er ugunstigt for æg og larver.

Undgå de mest følsomme afgrøder efter græs

Det anbefales at undgå de mest følsomme afgrøder til foråret, hvis der er mistanke om angreb af stankelbenlarver i græsset i forfrugten. Alle afgrøder angribes, men erfaringerne er, at ærter og majs er lidt mere robuste end de øvrige afgrøder. I majs har der tidligere i begrænset omfang været solgt udsæd bejdset med de såkaldte neonicotinoider, men det er nu også blevet forbudt for en periode på foreløbig 2 år, hvor det skal undersøges, om midlerne er farlige for bier.



Foto 1. Stankelben lægger æg i græs.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

