

Gylle til majs kan med fordel først udbringes i juni

Ved at flytte noget af kvælstoffet fra før såning til vækstperioden kan man mindske risikoen for tab af kvælstof ved udvaskning på grovsandet jord.

Af Peter W. Mogensen
pwm@landbrugsmediernes.dk
tlf. 33 39 47 52

Da majs først begynder at optage kvælstof i begyndelsen af juni, kan man med fordel vente med at udbringe dele af eller hele mængden af gylle til vækstperioden, mener landskonsulent Martin Mikkelsen, VFL, Planteproduktion.

En anden fordel ved senere udbringning er at mindske risikoen for kvælstoftab. Det er dog kun relevant på grovsandede jorder, præciserer Martin Mikkelsen.

Gyllen kan enten nedfældes mellem rækkerne eller udbringes med slanger. For at



Man afsætter kørespor allerede ved såning, hvis gyllen skal udbringes med slæbeslanger. Arkivfoto: Jens Tønnesen

sikre en god effekt af slangeudlagt gylle skal den forsuers, eller der skal radrenses enten lige før eller lige efter udbringning.

Kør ikke i rækkerne

Nedfældning af mellem rækkerne giver en sikker effekt af

gyllen, mener Martin Mikkelsen.

Han anbefaler, at gyllen nedfældes i otte-ti cm's dybde, og at tænderne på gyllenedfælderen er monteret med en indbyrdes afstand på 20 cm.

Hvis gyllen udlægges med slanger, bør der afsættes kø-

respor til gyllevognen allerede ved såning.

Udbringning med slanger i varmt vejr og på dage med megen vind har dog den ulempe, at det vil resultere i et stort tab fra ammoniakfordampning. Dette undgås ved forsuring.

Ud over gylle kan handelsgødning også udbringes i begyndelsen af juni. Hvordan og hvor meget kan du læse mere om i LandbrugsAvisen i næste uge.

Gylle i vækstsæsonen

- **Hele gyllemængden eller dele heraf kan med fordel udbringes i begyndelsen af juni måned**
- **Hvis gylle udbringes senere, skal der placeres 20-30 kg kvælstof pr. hektar i NP-gødning ved såning**