

PLANTEVÆRN



PLANTEVÆRN
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@effektivtlandbrug.dk
40 41 76 84 - 63 38 25 26



Halmrester smitter

Ved reduceret eller dårlig jordbehandling kan halmrester sprede svampesmitte til vinterhvede - især hvis der også var hvede året før.

Hvedebladplet kan findes i de fleste hvedemarker i Danmark, men en målrettet bekæmpelse er oftest kun nødvendigt, hvis forfrugten også var hvede, og man samtidig kun har foretaget reduceret jordbearbejdning, påpeger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Planterester fra hvede er nemlig smitekilden og jo flere halmrester, jo mere smitstof, siger hun og tilføjer:

- Ved mange planterester i pløjede marker kan der derfor også optræde angreb. I sjældne år kan angreb også optræde senere i sæsonen i pløjede marker på grund af fjernsmitte.

Brug delt aksbeskyttelse

- Der bør sættes på en delt aksbeskyttelse ved bekæmpelse af hvedebladplet, nemlig i vækststadium 37-39, hvor fanebladet synligt til fuldt udviklet og cirka 14 dage senere, oplyser Ghita Cordsen Nielsen.

Da svampen kan udvikle sig meget hurtigt, bør fanebladet ikke stå ubeskyttet ret længe. Fra smitten sker, til symptomer ses, går der kun 3-8 dage.

- En tidlig bekæmpelse omkring vækststadium 31-32, hvor 1-2 knæ er udviklet anbefales ved udbredte angreb, hvilket vil sige over 75 procent angrebne planter, oplyser hun videre.

Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning kan hvedebladplet være dominerende i afgrøden. Der er derfor ikke plads til Septoria eller hvedegråplet, som normalt er problemet i hvede.

Regnfulde år

Ved forfrugt hvede og samtidig reduceret jordbearbejdning kan det i år med fugtige forhold omkring blomstring være aktuelt at bekæmpe akxfusarium for at reducere indholdet af fusariumtoksiner.

Et lavere toksinindhold kan kun værdisættes, hvis man er svineproducent eller dyrker brødhvede.

- For at bekæmpelsen skal have bare nogenlunde effekt, er det meget vigtigt, at bekæmpelsen udføres i løbet af de cirka otte dage, hvor hveden blomstrer, understreger Ghita Cordsen Nielsen og fortæller:

- Jo flere halmrester, jo mindre nedbør vurderes det, at der skal til for at medføre smitte.

jpj

Halmrester fra en tidligere hvedemark er en kraftig svampesmitte kilde for blandt andet hvedebladplet og akxfusarium. (Foto: Videncentret for Landbrug)



Landdistrikter.dk
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Den Europæiske Landdistrikter og Fiskeri
Landdistrikter og Fiskeri
Landdistrikter.dk
Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.