

De første angreb af havreål er fundet i havre

Områder med blege og svage havreplanter kan skyldes havreål i jorden. I vårbyg er der endnu ikke fundet symptomer.

De første angreb af havrecystenematoder eller havreål ses nu, oplyser Viden-centret for Landbrug.

Symptomerne er, at planterne ser svage ud, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Rødderne bliver me-

get korte og tykke, og bladene er i havre tit rødlige. Angreb optræder pletvis eller stribevis i marken.

Skadevirkningen af havreål er større, når planterne i forvejen er svækket af dårlige vækstbetingelser som kulde eller tørke.

Resistens mod havreål

- Der er ikke modtaget vårbygprøver med angreb af havreål, hvilket nok skyldes, at mange af de dyrkede vårbygssorter er resistente mod havreål, oply-

ser Ghita Nielsen videre. Men flere sorter som for eksempel Columbus, Rosalina og Cha Cha er modtagelige.

I havre er kun sorten Dominik resistent.

- Ved store tætheder af havrecystenematoder kan resistente sorter også skades, og resistent havre er væsentlig mere følsom end resistente vårbygssorter, men der opnås en nedsættelse af mængden på cirka 60 procent om året ved at dyrke en resistent sort, oplyser hun videre.

Ved man, at der er mange havrecystenematoder i jorden, anbefales det derfor at dyrke en resistent vårbygssort frem for en resistent havresort indtil smitten er reduceret, da resistente sorter af havre skades mere end resistente sorter af vårbyg.

Alle vårhvedesorter er modtagelige.

Alle kornarter opformerer havreål, men modtagelige sorter af vårsæd - og især havre - skades mest af angreb, fordi

vårsæd angribes på et tidligt udviklingstrin i modsætning til vintersæd.

- Havrecystenematoder klækker nemlig om foråret. Ved dyrkning af ikke værter såsom ærter raps og lignende, kan regnes med en reduktion af nematodmængden på omkring 50 procent om året, fortæller Ghita C. Nielsen.

Majs angribes også af havrecystenematoder og kan skades, men der sker ikke nogen opformering i majs, idet nematoderne suger på rød-

derne, men der udvikles kun sporadisk æg i nematoderne. Majs er derfor er sanerende i sædskiftet for havreål.

Ved planlægning af sædskiftet skal der tages hensyn til, at havreål ikke bliver opformet.

En jordprøve udtaget i efteråret kan afsløre tætheden. Jordprøverne kan analyseres via firmaet BLGG AgroXpertus.

jpi



Landdistrikter.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske Union

Landdistrikter.dk

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.