

Kun syv dage til at sprøjte mod akksfusarium

Hvis en sprøjtning mod akksfusarium i hvede skal have en rimelig effekt, skal den udføres inden for de cirka syv dage, hvor hveden blomstrer.

Det er kun nødvendigt at bekæmpe akksfusarium under visse betingelser og i et begrænset antal marker, oplyser Videncentret for Landbrug.

Nedbørsforhold omkring blomstring, jordbearbejdning og forfrugt er de vigtigste parametre, når behovet for at bekæmpe akksfusarium fastlægges, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Bekæmpelse af akksfusarium

foretages for at reducere indholdet af svampegifte i korn, der skal anvendes til foder eller til brødhvede.

Problemet er, at grise er følsomme over for høje toksinniveauer, og i EU er der fastsat grænseværdier for korn til human ernæring, blandt andet brødhvede. Ved salg af brødhvede skal toksin-indholdet ligge under de vejledende grænseværdier.

Sædskifte og reduceret jordbearbejdning

Der ses mest akksfusarium ved forfrugt majs og ved forfrugt hvede eller tritcale og samtidig reduceret jordbearbejdning, oplyser Ghita Nielsen videre.

- Jo flere planterester fra



Enkelte småaks angrebet af akksfusarium. (Foto: Videncentret for Landbrug)

forfrugten - jo mere smitstof er der.

Er det fugtigt omkring blomstring, kan sprøjtning rettet

mod akksfusarium være aktuel under disse dyrkningsbetingelser.

- Ved pløjning er toksin-

niveauerne oftest lave, og bekæmpelse af akksfusarium anbefales ikke, understreger hun videre.

Nedbør nødvendig

Hyppig nedbør omkring blomstring fremmer angreb. Hvor forfrugten er majs, kan høje toksinniveauer også forekomme uden hyppig nedbør. Forfrugt majs for hvede og tritcale frarådes generelt.

- Bliver høsten meget forsinket på grund af hyppig nedbør, kan dette også øge toksinindholdet, men svampesprøjtning har ikke effekt mod denne sene smitte.

Alle hvedesorter er mere eller mindre modtagelige for angreb af akksfusarium. De mest dyrkede sorter er middel modta-

gelige, mens Elixer og Genius er lidt mindre modtagelige.

Bekæmpes på blomstringstidspunktet

- For at sprøjtning skal have en rimelig effekt, skal den udføres i løbet af de cirka syv dage, hvor hveden blomstrer, understreger Ghita Nielsen.

Det er derfor nødvendigt at udføre en delt akksbeskyttelse, hvor sidste behandling trækkes til under blomstringen. Hvis der bliver over tre uger mellem de to behandlinger, må der i stedet udføres en ekstra behandling under blomstringen.

Lykkes det ikke at få bekæmpet omkring blomstring, dropes behandlingen, da effekten så vil blive for dårlig.

jpi



Landdistrikter.dk

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.