

Nu findes der ærterodråd i ærter

Sædskiftesygdommen kan ikke bekæmpes, men kan konstateres med en jordtest.

 Den sidste uges tid er der set flere tilfælde af angreb af sædskiftesygdommen ærterodråd i ærter og ærtehelsæd, oplyser landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen.

Rødderne mørkfarves, og områdevis i marken gulner planterne og er lavere. Svampen opformeres ved hyppig ærte dyrkning, og fugtig jord fremmer smittespredningen.

Ærterodråd er den mest



Indsamlede ærter angrebet af ærterodråd.

tabsgivende svampesygdom i ærter.

Jordtest ved mistanke

Der er ikke nogen bekæmpelsesmetode bortset fra sædskifte med ophold i ærte dyrkningen. Svampen kan holde sig smittedygtig i jorden i 15-20 år.

Der er udviklet en jordtest, der kan fastslå smitstofmængden af ærterodråd i jorden. Det anbefales at få udført en jordtest i efteråret, hvis der er mistanke om meget smitstof i markerne, hvor der skal være ærter i 2014.

jpj

Effektivt Landbrug side 14
lørdag den 15. juni 2013

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD) men ikke synlig.

Afstandskravet til vandmiljøet er 20 meter.
Dispensationen gælder også sukermajs.