

TEMA: GYLLE OG STALDGØDNING



For de få sukkerroedyrkere, som har udlagt en gul korsblomstret efterafgrøde forud for roerne, er det tilladt, at udbringe gylle på efterafgrøden nu. En fordel er, at bedriftens opbevaringskapacitet øges. (Foto: Bøje Østerlund)

Gylle på efterafgrøde giver mere plads i gylletanken

For at skabe mere plads til gylleopbevaringen senere på året kan man – i ganske bestemte sædskifter – udbringe noget af gyllen på efterafgrøden. Det kræver sukkerroekontrakt.

AF JØRGEN P. JENSEN

aktuelt tema Lad os slå fast med det samme: I de såkaldte pligtige efterafgrøder må man ikke køre gylle.

- Det er begrundet med, at man er bekymret for at opheve effekten af efterafgrøden ved at tilføre gylle om efteråret, påpeger chefkonsulent Leif Knudsen fra Videncentret for Landbrug.

Spørgsmål har ellers været rejst fra flere praktiske landmænd, om man kunne forbedre sin opbevaringskapacitet af gylle og især forbygge pladsmangel hen mod foråret, ved allerede i sensommeren at tømme gylle ud på de pligtige efterafgrøder.

- Det må man kun i ét særligt specifikt sædskifte, oplyser Leif Knudsen.

Kræver sukkerkontrakt

- Hvis man har sukkerroekontrakt og – som det faktisk har været ret udbredt – forud for sukkerroerne har en gul korsblomstret efterafgrøde, så må man udbringe gylle på denne efterafgrøde.

Gul sennep bruges en del forud for sukkerroer for at bekæmpe roenematoder.

Det er således et meget begrænset antal landmænd, hvoraf en stor del heller ikke har husdyr, som kan benytte denne mulighed for at ekstra tømning af gylletankene.

Højere sukkerudbytte

Tidligere forsøg med tilførsel af gylle om efteråret på efterafgrøden gul sennep forud for sukkerroer har vist forbedret sukkerudbytte i roerne.

- Efterafgrøde af gul sennep har hævet udbyttet af sukker i den efterfølgende sukkerroefafgrøde ved samme kvælstofniveau om foråret. Tilførsel af 80 kg ammoniumkvælstof pr. hektar i gylle til gul sennep om

efteråret har bevirket et signifikant højere sukkerudbytte i roerne ved samme kvælstofniveau om foråret, skriver Leif Knudsen om forsøgene og han fortsætter:

- Forsøgene viser gul senneps evne til at optage kvælstof om efteråret selv ved såning sidst i august.

- Resultaterne af forsøgene viser også, at der på lerjord, der regelmæssigt får tildelt husdyrgødning ikke er behov for at tildele efterafgrøden af gul sennep kvælstofgødning ved såning for at få en rimelig planteudvikling.

Men han konkluderer også, at forsøgene samlet viser, at det ikke er forbundet med en øget udvaskningsrisiko at tildele gul sennep gylle om efteråret i rimelige mængder.

Men i følgende gældende regler altså kun, når der følgende år dyrkes sukkerroer.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon 40 41 76 84



Gul sennep bruges en del som sanerende efterafgrøde for nematoder forud for sukkerroer. Den kan samtidig modtage rimelige mængder gylle om efteråret. (Foto: Kaj Lund Sørensen)

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)