

PLANTEFOKUS

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og FiskeriDen Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



PLANTEAVL

Kontakt: Jens Mathiasen
jema@effektivtlandbrug.dk
63 38 25 37 - 61 22 67 55

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Bekæmpelse af skræpper i græs

■ - Vi har set en del forekomster af skræpper i græsmarkerne, skriver planteavlskonsulent Annemette L. Poulsen i Afgrødenyt fra LMO, hvor hun informerer om mulighederne for bekæmpelse her i efteråret med glyphosat, hvis græsmarken skal omlægges til næste forår.

- Skræpper er en relativ sejlivet plante. Derfor skal der en forholdsvis høj dosering glyphosat til for at få en effektiv bekæmpelse. Den bedste effekt i efteråret får du ved at bruge 1.400 gram aktiv stof (4 l/ha Glyphosat 360), to til tre uger efter slæt eller afgræsning.

Alternativt kan man vente med bekæmpelse til foråret. Her er en bedre saftstrøm rundt i planten, og skræpper kan bekæmpes med en lavere dosis glyphosat eller med et ukrudtsmiddel som Harmony, Ariane FG eller Starane XL, som har god effekt på skræpper i foråret.

Ulempen ved bekæmpelse i foråret inden omlægning er lidt senere såning.

Regler for omlægning af fodergræs

■ Fodergræsmarker må generelt ikke omlægges om efteråret. De må dog omlægges frem til 15. august, hvis de omlægges til fodergræs igen.

For brug med op til 1,7 DE pr. ha gælder, at hvis der skal etableres en anden afgrøde efter fodergræs, må jordbearbejdning og omlægning kun ske i perioden 1. februar til 1. juni. På JB 7-9 dog i perioden fra 1. november til 1. juni. Omlægning fra fodergræs til fodergræs må ske frem til 15. august. Græsudlægget må gerne etableres i grøn-korn.

For brug omfattet af undtagelsesbestemmelsen med 2,3 DE gælder, at omdriftsgræs kun må pløjes i perioden fra 1. marts til 1. juni. Desuden må der ikke tilføres husdyrgødning i perioden 31. august til 1. marts til en græsafrøde, som pløjes i samme planperiode.

Der er ikke regler for, hvornår græsmarkerne må nedvisnes. Hverken efter de generelle regler eller på brug omfattet af undtagelsesbestemmelserne. På sidst nævnte brug skal man være opmærksom på, at nedvisning af græsefærafgrøde først må ske efter 1. marts.

Autoriserede økologiske bedrifter er ikke omfattet af reglerne. Det oplyses på Landbrugsinfo.

Afgræsningsmarkerne lige nu

■ Vi har indtil nu haft et fantastisk dejligt efterår, hvor der kun har været få steder med frost. Græsset gror stadig, men ikke så meget som tidligere på sæsonen. Det er derfor vigtigt at få reguleret antal dyr (kg) pr ha, så vi ikke lader »øjjet fede studen«.

Det skriver kvægbrugskonsulent, Kirstine Lauridsen, på Økologisk Landsforenings Rådgiverblog.

Nogle græsmarker er ædt godt ned, men hvis der er mulighed for suppleringsfodring kan dyrenes tilvækst stadig holdes. Kvierne kan også flyttes til slætmarker, så de stadig har et godt "bid", anbefaler hun.

Strukturskader er markbrugets store problem

■ Vi har ødelagt et areal med al for tung trafik og forkert dæktryk, og dermed lavet voldsomme strukturskader.

Det skriver Patriotisk Selskab i invitationen til efterårsdemonstrationen på Bramstrup Videncenter, der afholdes i dag tirsdag den 8. oktober.

- Kom og se om strukturskader kan løses ved hjælp af forskellige grubbere, harver/harvetænder eller plove. Se hvad dæktype, dæktryk og akseltryk betyder for at undgå strukturskader.

- Vi har samlet 22 forskellige maskiner/redskaber, som bliver sat på opgaven at løse strukturskaderne.

- Mød op på Bramstrup Videncenter, hvor vi præcis klokken 13 opdeler alle tilskuere i hold og demonstrationen sættes i gang, lyder opfordringen.

Græsmarken skal gøres klar til vinteren

God overvintring af græs er ikke alene afhængig af, hvor kold vinteren bliver, og hvor meget sne der kommer, men også hvordan vi behandler græsset inden vinter.

■ God management i perioden inden vinteren kan gøre græsset mere robust, når vinteren sætter ind.

En god overvintring afhænger normalt af følgende elementer: Stubhøjde ved sidste slæt, arealets kvælstofniveau efter sidste slæt, arealets kaliumstatus inden vinter samt de forskellige arters og sorter evne til at overvintrere. Det fremgår af PlanteNyt 941.

- For alle græsarter gælder, at det er vigtigt, at græsset er i ro, inden vinteren sætter ind, og at den har en del grønne blade. Ved begyndende frost skal det tilbageværende græs, det vil sige stubben, have et grønligt skær. Det vil sige, at der skal være to til tre grønne bladplader tilbage efter slæt, forklarer Videncentrets landskonsulenter Karsten Attermann Nielsen og Martin Mikkelsen.

Stubhøjde ved sidste slæt

- På nuværende tidspunkt, det vil sige i begyndelsen af oktober kan det være hensigts-

mæssig at høste det sidste slæt med en kort stub på fire til fem cm, da vi må forvente, at der vil være en mindre produktion i resten af oktober.

- I perioden 10.-20. oktober, hvor vi »håber«, at det sidste slæt kan tages, vil det for de fleste blandinger være hensigtsmæssig at have en stubhøjde på cirka syv 7 cm eller lidt derover.

- I tiden efter den 20. oktober, hvilket kan være for sent, bør stubhøjden være længere, det vil sige otte til ti cm, lyder anbefalingerne.

Tømt for kvælstof

Kvælstof har meget stor betydning for græssernes overvintring. Især alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel skal helst have tømt jorden for

kvælstof inden vinter. Derfor er tømning af gylletanken på græsset sidst i september af det onde med hensyn til overvintring. Det samme gælder for arealer, der kun har været afgræsset i vækstperioden, og som har været belastet af dyrenes gødning gennem hele vækstperioden.

Disse arealer er meget sårbare, og risikoen for udvintring i disse systemer er betydelig, hvis der ikke er fjernet noget kvælstof fra arealet ved en slæt i sommerperioden.

Betydning af kalium

Kaliummangel har også betydning for græssets overvintring. Ved et normalt indhold af kalium i jorden er det et mindre problem end overskud af kvælstof.

God overvintring

En god overvintring afhænger normalt af følgende elementer:

- Stubhøjde ved forskellige tidspunkt for sidste slæt.
- Arealets kvælstofbelastning/kvælstofniveau efter sidste slæt.
- Arealets kaliumstatus inden vinter.
- De forskellige arters evne til at overvintrere. Der er stor forskel på overvintring mellem arterne og også lidt forskel på sorterne.

Kilde: PlanteNyt 941

Inden vinteren sætter ind, skal græsset være i ro og have en del grønne blade. Ved begyndende frost skal det tilbageværende græs – stubben – have et grønligt skær. På denne mark ved Ølgod er der netop tage sidste slæt. (Foto: Kaj Lund Sørensen)

