



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Behovsbestemt bekæmpelse > Havrerødsot i vinterhvede

Havrerødsot i vinterhvede

Der er eksempler på, at symptomerne er mindre typiske end normalt, men de røde bladspidser er nu tydelige

De sidste par uger er modtaget flere henvendelser om angreb af havrerødsot i vinterhvede. Tidligere i foråret var der kun få henvendelser om angreb. Nogle beretter, at symptomerne er mindre typiske end normalt, dvs. de optræder mere spredt i marken og ikke så typisk pletvis. Planteøjden er heller ikke så meget lavere. De røde bladspidser er dog synlige nu, og gør det svært at forveksle symptomerne med andre årsager.

Der er også set tilfælde af mindre angreb af havrerødsot i forageren, hvor der er brugt glyphosat før høst i forfrugten.

Der er foretaget en serologisk Elisatest på indsendte planter, som har vist angreb af havrerødsot.

I efteråret 2012 blev fundet forholdsvis få bladlus i registreringsnettet, og i næsten alle disse marker ses nu ingen havrerødsot bortset fra 1-2 procent angrebne planter i 3 marker i Sønderjylland.



Billede 1 og 2. Havrerødsot i vinterhvede – foto fra tidligere år. Når de røde bladspidser bliver synlige, kan angreb ikke forveksles med andre årsager.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'