

[Hjem](#) > [Landdistriktsmidler](#) > [2013](#) > [Behovsbestemt bekæmpelse](#) > **Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 45**

Registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 45


Der er stadig kun fundet få bladlus. Der skal nu ikke foretages flere registreringer.

Forekomsten af bladlus følges i 32 vinterhvede- og 20 vinterbygmarker. Der bedømmes i tidligt såede marker (sået før 15. september) og i milde områder, hvor risikoen for angreb af bladlus og dermed havrerødsot er størst.


I vinterbyg er der denne uge fundet bladlus i 1 (0,1 procent angrebne planter) af pt. 11 indberettede marker. I vinterhvede er der denne uge ikke fundet bladlus i nogen af pt. 19 indberettede marker. Angrebene ligger i år noget lavere end i efterårene 2007 og 2011, hvor angrebene lå højest i perioden 2007-2012. Se figur 1-2 nedenfor. Registreringsnettet blev startet i efteråret 2007 efter de kraftige angreb i vækstsæsonen 2007.

Nedenfor ses i figur 3 også fangster af bladlus i en sugefælde ved Alnarp i Sydsverige (Kilde: Jordbruksverket). Det fremgår af figuren og linket nedenfor, at der i forhold til efteråret 2006 kun er relativt lave fangster i efteråret 2013, selv om der de seneste uger er fanget lidt flere bladlus. I vækstsæsonen 2007 optrådte der også relativt kraftige angreb af havrerødsot i Sverige som følge af de mange bladlus i efteråret 2006.


Dette var sidste registrering i år. Vi takker for indberetningerne.



Figur 1. Forekomsten af bladlus i registreringsnettet i vinterbyg i efterårene 2007-2012.



Figur 2. Forekomsten af bladlus i registreringsnettet i vinterhvede i efterårene 2007-2012.



Figur 3. Antal havrebladlus pr. uge fanget i sugefælden ved Alnarp i Sverige i 2006 og 2009-2013.

[Veckorapport Alnarp vecka 45 - sugfällanfångster](#)

Se data og yderligere kommentarer i [vinterhvede](#) og [vinterbyg](#).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.