



Registrering af rapsjordløpper i uge 43

Tærsklen for rapsjordløpper er pt. overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne.

Der er udsat gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordløppers larver.

Der findes stadig relativ få rapsjordløpper. I nedenstående figur er udviklingen i år sammenholdt med udviklingen i tidligere år.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales, hvis der indenfor 3 uger i alt fanges over 25 rapsjordløpper pr. fangbakke.

Tærsklen har i år indtil videre været overskredet på ca. 15 procent af lokaliteterne, og på mange af disse lokaliteter er der kun netop fundet over bekæmpelsestærsklen.


Til bekæmpelse kan anvendes Karate (0,2 kg pr. hektar), Nexide CS (0,06 liter pr. ha) eller Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha), hvor Karate er billigst med de nye afgifter.

Registreringen i den kommende uge er sidste registrering i år.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Figur 1. Fangster af rapsjordløpper i gule fangbakker i efterårene 2007-2013. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentar](#)

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.