



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Behovsbestemt bekæmpelse > Registrering af rapsjordlopper uge 39 og andre skadedyr i raps

Registrering af rapsjordlopper uge 39 og andre skadedyr i raps

Der er pt. stadig kun meget få rapsjordlopper. I flere marker ses kålmøllarver og minerfluer.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 70 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordloppers larver.

Der er pt. stadig kun meget få rapsjordlopper. I figur 1 nedenfor er udviklingen i år sammenholdt med udviklingen i tidligere år.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales, hvis der indenfor 3 uger i alt fanges over 25 rapsjordlopper pr. fangbakke.

Tærsklen er pt. kun overskredet på 3 lokaliteter, hvilket svarer til 7 procent af indberetningerne denne uge. På to af disse lokaliteter er der dog kun netop fanget 26 rapsjordlopper.

Larver af kålmøl, minerfluer og kålfluer

Den senere tid er også modtaget flere henvendelser om angreb af kålmøllarver og/eller minerfluelarver på bladene i vinterraps. Se billede 1-2. Minerfluer kravler også ind i bladstilkene, hvor de senere kan forveksles med rapsjordloppers larver, men fluelarver er lemmeløse i modsætning til billelarver, der har ben. Minerfluer går ikke ind i stænglen som rapsjordloppelarver. Minerfluer i bladstilkene kan ikke bekæmpes med et pyrethroid.

Angreb af begge skadedyr er oftest af mindre betydning, og bekæmpelse er oftest ikke aktuel. Kun i sentsåede marker med usædvanlig udbredte angreb kan bekæmpelse af kålmøllarver være aktuel, og der kan anvendes pyrethroider, der er godkendt mod rapsjordlopper.

I enkelte marker er også set angreb af 3. generation kålfluelarver i rødderne. De hvide fluelarver og boregange ses (ligner minerfluen i billede 2), og der er et brunt råd omkring angrebet. Skadedyret har fået øget betydning i visse områder af Tyskland de senere år især ved tidlig såning, og i disse områder er anbefalet bejdsning med specialbejdsere med en stor mængde aktivstof, men efter forbuddet mod neonicotinoide er det nu ikke længere muligt. Ved svage angreb tillægges larverne kun mindre betydning. Hvis over halvdelen af roden angribes, angives det, at planterne kan visne.




Billede 1. Kålmøllarve samt gnav. Både "vinduesnav" og huller, der er gnavet helt igennem, ses. Foto: Kenneth Svensson, Gefion.

Promilleafgiftsfonden for landbrug





Billede 2. Angreb af minerflue.



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2007-2013. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentar](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.